

Exempel på lagrings- och användningstider för läkemedel i bruten förpackning på vårdenhet, om inte annat anges av tillverkaren eller i Region Jönköpings spädningsinstruktioner.

Förteckningen baseras på användningstid angivet i Svensk läkemedelsstandard (SLS 2026.0)

Läkemedelsform	Användningstid
Infusionsvätska efter applicering av droppaggregat	12 timmar
Infusionsvätska med tillsats	12 timmar
Injektionsläkemedel, bruten ampull	Omedelbar användning
Injektionsläkemedel, i uppdragen spruta	12 timmar vid förvaring i rumstemperatur 24 timmar vid förvaring i kylskåp
Injektionsläkemedel, okonserverade i flerdosbehållare	12 timmar vid förvaring i rumstemperatur 24 timmar vid förvaring i kylskåp
Injektionsläkemedel, konserverade med uttag för användning till flera patienter	7 dagar
Injektionsläkemedel, konserverade med uttag för användning till enskild patient	28 dagar
Spolvätskor	Vid kirurgi gäller omedelbar användning. Vid annan användning gäller 24 timmar
Ögondroppar och ögonsalvor, vid kirurgi	Omedelbar användning
Ögondroppar och ögonsalvor, okonserverade till enskild patient	Omedelbar användning
Ögondroppar och ögonsalvor, konserverade som används till flera patienter	7 dagar
Ögondroppar och ögonsalvor, konserverade till enskild patient	28 dagar
Konserverade flytande eller halvfasta vattenhaltiga läkemedelsberedningar (mixturer, salvor, geler)	Högst 6 månader (vid förvaring i originalförpackning) Från denna regel finns undantag beroende på användningsområde och hantering. Se SLS för mer information
Desinfektionsmedel	Alkoholbaserade - 1 månad till flera patienter Vattenbaserade - 1 vecka till flera patienter