

## Bröst Vinorelbin 60 mg/m<sup>2</sup> - Capecitabin 1000 mg/m<sup>2</sup>

Cytodose = "Bröst Vinorelbin 60 mg/m<sup>2</sup> - Capecitabin 1000mg/m<sup>2</sup> 21 d"

Kurintervall 21 dagar

Indikation: Bröstcancer

### Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m <sup>2</sup>	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Capecitabin	1000 (dvs. 2000 mg/m <sup>2</sup> per dygn)	2	28	p.o.	1-14
B	Vinorelbin	60	1	2	p.o.	1,8

	Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Paus dag 15-21	Dag 22 ny cykel/kur
A	Capecitabin	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
B	Vinorelbin	B	-	-	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-		

### Övrigt

- Testa för DPYD-brist innan capecitabin ges
- Om patienten har få eller inga biverkningar kan dygnsdosen ökas till 2500 mg/m<sup>2</sup>
- EKG vid anamnes på hjärtsjukdom
- [Att förebygga och behandla Hand- fotsyndromet](#)
- Uppföljning med avseende på hand-fot syndrom och övrigt enligt NCIC-gradering via telefon med sjuksköterska dag 8 och 15 samt vid varje besök
- Kapselstorlek Vinorelbin: 20 mg, 30 mg, 80 mg
- Antiemetika: T Ondansetron 8 mg ca 1 timme före intag av Vinorelbin.
- [Provtagning, rutinmässig](#) (se Capecitabin och vinorelbin separat i tabellen)

### Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC -gradering

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4:e gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen
Grad II	Återuppta (fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen

Grad III	Återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen	
Grad IV	Avsluta behandlingen			

[Biverkningar - gradering av toxicitet i samband med behandling med capecitabine](#)

### Dosreduktion hematologi

Substans	Neutrofila		TPK	
	< 1,5*		<100*	
Capecitabin	Paus i en vecka. Nästa behandling 75 % av fulldos		Paus i en vecka. Nästa behandling 75 % av fulldos	
Substans	Neutrofila	Neutrofila	TPK	TPK
	≥ 1,0	< 1,0	≥100	<100
Vinorelbin	100 %	Behandlingen utgår	100 %	Behandlingen utgår

\*OBS, vid adjuvant behandling bör en samlad bedömning göras om rimligt att ändå ge behandling trots hematologisk toxicitet.

[Patientinformation \(OBS att Vinorelbin är iv i denna patinfo\)](#)

### Körschema dag 1

	Att göra	Var ordinerat
1	Skriv ut medicinlista från ELAS	
2	Lämna tabletter och medicinlistan till patienten  Informera patienten om att han/hon skall svälja capecitabin hela tillsammans med måltid eller inom 30 minuter efter avslutad måltid, samt att ta doserna med ca 12 timmars intervall.  Vinorelbin ska sväljas hela med vatten i samband med måltid. Säkerställ att patienten har tillgång till T. Ondansetron 8 mg.	Cytodose

### Körschema dag 8

	Att göra	Var ordinerat
1	Provtagning och telefonkontakt med patienten dag 8 innan patienten tar ny dos Vinorelbin	Cytodose