

CNS Bevacizumab 14 d

Cytodose="CNS Bevacizumab 10 mg/kg 14 d"

Kurlängd 14 dagar

Indikation: Glioblastom recidiv

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Bevacizumab (Avastin)	10 mg/kg kroppsvikt	1	1	i.v.	1

	Substans/dag	1	Dag 15 ny cykel
A	Bevacizumab (Avastin)	A	

Övrigt

- Bevacizumab dosreduceras ej (undantag om vikten ändras mer än 10%)
- Behandling med Bevacizumab ska inte påbörjas förrän tidigast 28 dagar efter ett större kirurgiskt ingrepp. Säkerställ att operationssår är läkt. Behandling med Bevacizumab ska utsättas 6 veckor före större kirurgiskt ingrepp.
- Antiemetika [lågemetogen](#)
- **Provtagningsrutin:** Proteinuri mäts med stickprov U-Alb/Krea-kvot. Patienten lämnar urinprov till laboratoriet i samband med övrig blodprovstagning inför behandling, tidigast 3 dagar innan behandling. U-Alb/Krea-kvot bedöms som ett säkrare mått på albuminuri jämfört med provtagning med urinsticka.
- [Proteinuri och hypertension vid VEGF-behandling](#)

Behandlingsrekommendation proteinuri:

U-Alb/Krea < 150 mg/mmol	U-Alb/Krea ≥ 150 mg/mmol	CTCAE v5 grad 3-4 U-Alb/Krea ≥ 350 mg/mmol
Ge Bevacizumab	Uppehåll Bevacizumab	Sätt ut Bevacizumab permanent

* Om Bev-uppehåll (≥ 150 mg/mmol) vid flera tillfällen, eller om ≥150mg/mmol efter 8 veckor: seponera

Behandlingsrekommendation hypertoni:

Blodtryck ska tas efter ca 15 min vila inför varje kur, **gradering enl. CTCAE v5.0:**

Grad 1	Grad 2	Grad 3	Grad 4
Sys 20-139 mmHg Diast 80-89 mmHg	Sys 140-159 mmHg Diast 90-99 mmHg	Sys ≥160 mmHg Diast ≥100 mmHg	Malign hypertension (hypertensiv kris)
Ge VEGF-	Ge VEGF-hämmare Överväg	Gör uppehåll VEGF-hämmare Mät BT x flera på VC eller 24h-	Avbryt VEGF-hämmare

hämmare	antihypertensiv behandling*	mätning Ge antihypertensiv behandling om indikation för behandling kvarstår* +	
---------	-----------------------------	--	--

*Initiera, titrera eller lägg till antihypertensiv behandling. I första hand rekommenderas ACE-hämmare eller Ca²⁺-blockare. Därefter se till att blodtrycket är reglerat ca <155/95 innan VEGF-hämmare ges igen. Värt att notera: ACE-hämmare minskar också proteinuri.

+ Om okontrollerad hypertoni (>160/100) kvarstår >4 veckor bör man överväga att avbryta VEGF-behandling.

[Patientinformation](#) (äggstock)

Körschema Bevacizumab dag 1

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Kontrollera blodtryck innan start av bevacizumab		
2	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter bevacizumab.		
3	Ge Bevacizumab spädd i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml intravenöst.	30 minuter	Cytodose