

Uro Pazopanib (Votrient) p.o.

Cytodose= saknas

Cykellängd: Kontinuerlig

Indikation: Njurcellscancer

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Dygns dos	Adm
A	Pazopanib	800*	1	max 800 mg	per oralt

* Stegvis dosökning till max 800 mg

Övrigt

- [Provtagning, rutinmässig](#)
- Blodtryck 1 ggr/vecka i 8 veckor, sedan 1 ggr/ månad. Patienten kan ta blodtryck på vårdcentralen alt. med egen blodtrycksmätare i hemmet. Be patienten höra av sig till kontaktsjuksköterska om blodtrycket överskrider 160/100 mmHg.
- Interaktioner, se [FASS](#)
- Sjuksköterska kontrollerar prover och kontaktar läkare vid avvikande provsvar (rödmarkerat i BoS eller enligt journaltext). Patienten får ingen bekräftelse på proverna så länge de är normala. Vid minsta tveksamhet ska sjuksköterska kontakta läkare; 1. PAL, 2. Cytordinatör, 3 Dagjour.
- Tabletter finns i styrkorna 400 mg samt 200 mg.
- Perukremiss övervägs
- [Att förebygga och behandla hand-fotsyndrom](#)
- [Hantering av leverpåverkan](#)
- Artikel ["Toxicities of targeted therapy and their management in kidney cancer"](#)

Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC -gradering

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4: gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen
Grad II	Återuppta (fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (75% av fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (50% av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen
Grad III	Återuppta (75% av fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (50% av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen	
Grad IV	Avsluta behandlingen			

- Biverkningmonitorering, [Checklista](#)

Patientinformation

[Patientinformation Pazopanib RCC](#)

- [Patientinformation Votrient](#)

Start

	Att göra	Var ordinerat
1.	Informera patient om behandlingen. Dela i dosett för 14 dagar, biverkningar, provtagning och uppföljning. Hur sköter patienten läkemedelsbehandling	
2.	Skicka med tabletter från läkemedelsförråd på mottagningen, för en månads förbrukning.	Medicinskt tumörbehandlingskort

Uppföljning

	Att göra	Var ordinerat
1.	Tablettbehandling, compliance Planera återbesök vid behov	
2.	Skicka med tabletter från läkemedelsförråd på mottagningen, för en månads förbrukning. Därefter om patienten mår väl, sköts uttag av tabletter av patienten	Medicinskt tumörbehandlingskort
3.	Om patienten avbryter behandlingen - be henne/honom att ta med resterande läkemedel tillbaka (enligt rutiner för kliniska prövningar)	

Anmärkningar

- Tabletterna ska tas 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.
- Grapefrukt, grapefruktjuice och johannesörtspreparat får ej intas under vid behandling
- Information; uppmärksam på hand - fot syndrom och huvudvärk (blodtrycksstegring)