

GI Irinotekan 14 d

Cykellängd (kurintervall) 14 dagar

Indikation: Kolorektalcancer

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings- tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings- tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Irinotekan	180	1	1	i.v.	1

	Substans/dag	1	Paus dag 2-14	Dag 15 ny cykel/kur
A	Irinotekan	A	-	

Övrigt

- [Antiemetika medelemetogen](#)
- Irinotekan - premedicinering: ge subkutant Atropin 0,25 mg för att förebygga akut kolinergt syndrom. Om symtom uppstår, ge ytterligare subkutant Atropin 0,25-0,50 mg.
- Var särskilt observant vid diareé och feber. Kan kräva inläggning.
- [Provtagning, rutinmässig](#)

Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC-gradering för Panitumumab

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4: gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen
Grad II	Återuppta (fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen
Grad III	Återuppta (50 % av fulldos gäller hudreaktioner) vid tox 0-1. Se FASS för Vectibix	Återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen	
Grad IV	Avsluta behandlingen			

Dosreduktion hematologi

Neutrofila	TPK	Irinotekan
≥ 1,5	≥100	100 %
	75-99	50-75 %
< 1,5	<75	Behandlingen uppskjutes 3-7 dagar. Överväg dosreduktion vid nästa kur.

Patientinformation[Patientinformation Irinotekan](#)[Antiemetikaschema, medeleemetogen](#)**Körschema**

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Kontrollera att patienten tagit antiemetika		Cytodose
2	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		-
3	Ge subcutan injektion av Atropin (ca 30 min före irinotekan)		Cytodose
4	Ge Irinotekan spädd i 500 Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	30 minuter	Cytodose