

GI Capecitabin/ strål

Cytodose= "GI Capecitabin - komb med strålbeh 2 veckor"

Indikation: Rektalcancer, neoadjuvant

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser	Adm	Dag
A	Capecitabin	825 (1650 mg/m ² per dygn)	2	Dagligen så länge strålningen pågår	p.o.	

	Substans/dag	dag 1- till dag då strålning avslutas
A	Capecitabin	A

Övrigt

- Testa för DPYD-brist innan behandling ges.
- Strålbehandling - 1,8 / 2,0 Gy/fraktion till 45/50,0 Gy i 25 fraktioner med simutanintegrerad boost
- [Antiemetika vid behov](#)
- Ordination görs 1-2 veckor åt gången. Principen är veckokontroll av läkare. I Cytodose är regimallen byggd för två veckor åt gången, om du vill ordinera endast en vecka; makulera de 7 sista kurdagarna.
- [Att förebygga och behandla Hand-fotsyndromet](#)
- [Provtagning, rutinmässig](#)
- Uppföljning med avseende på hand-fot syndrom och övrigt enligt NCIC-gradering via telefon dag 8 vecka 1 med sjuksköterska, samt vid varje besök.

Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC -gradering

Tox grad	Diarré	Capecitabin	Strålbehandling
0	Ingen diarré och ingen ökning av avföringsfrekvens	100 %	Fortsätt
1	<4 avföringar per dag	100 %	Fortsätt
2	4-6 avföringar per dag, eller moderata kramper	Uppehåll till grad ≤1, sedan 1 gången: 100 % 2 gången: 75 % 3 gången: 50 %	Fortsätt Administrera Loperamid
3	7-9 avföringar per dag eller inkontinens (om patienten var kontinent före beh), eller svåra kramper	Uppehåll tills grad ≤1, sedan 1 gången: 75 %	Uppehåll tills diarrén är grad ≤ 2

		2 gången: 50 %	
4	≥ 10 avföringar per dag, eller melena eller behov av parenteral support.	Avbryt Capecitabinbehandlingen	Avbryt till diarrén är ≤ grad 2. (Om det tar mer än 2 veckor ska strålbehandlingen avbrytas permanent.)

[Biverkningar - gradering av toxicitet i samband med behandling av capecitabin](#)

Dosreduktion hematologi

Tox grad	Neutrofila	Trombocyter	Capecitabin	Strålbehandling
0	>2.0	≥ 100	100 %	Fortsätt
1	1.5 - 2.0	75 - 99	100 %	Fortsätt
2	1.0 - 1,49	50 - 74	75 %	Fortsätt
3	0.5 - 0,99	10 - 49	Uppehåll tills återhämtning	Fortsätt
4	<0.5	<10	Uppehåll tills återhämtning	Uppehåll tills återhämtning

[Patientinformation Capecitabin och strål](#)

Körschema

	Att göra	Var ordinerat
1	Skriv ut medicinlista från ELAS	Cytodose
2	Lämna tabletter och medicinlistan till patienten	