

Lung Selperkatinib (Retsevmo)

Kontinuerlig behandling. Tyrosinkinashämmare.

Indikation

Icke småcellig lungcancer. RET-fusionspositiv (rearrangerad under transfektion) status ska fastställas.

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm
A	Selperkatinib (Retsevmo)	160 mg	2	Kontinuerlig behandling	p.o.

Kapslarna finns i 40 och 80 mg

Övrigt

- **Prover och kontroller:**

Inför behandlingstart: Blodstatus + neutrofila, njurstatus, leverstatus inkl ASAT, EKG och blodtryck

Under behandling: Prover efter 1 och 2 veckor och vid läkarbesök. EKG och blodtryck efter 1 vecka och vid läkarbesök

- EKG, QTc \leq 470 msek. Elektrolyter inom normalnivåer.
- Observera rekommenderad startdos för patient under 50 kg är 120 mg X 2.
- Selperkatinib är en interaktionsbenägen substans som kan påverkas av och påverka effekten av andra läkemedel, se FASS.
- Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Om en patient kräks eller missar en dos tas nästa dos vid nästa planerade tillfälle. Ingen extra dos ska tas.
- Vid samtidig behandling med protonpumpshämmare (tex omeprazol) ska Selperkatinib tas med mat
- Undvik samtidigt intag av grapefrukt och grapefruce under behandlingstiden.

Dosereduktion

Dosen kan sänkas i steg om -40 mg X 2 till minimidosen 40 mg X 2. Dosjustering pga biverkningar, se [tabell 2 FASS RESEVMO](#).

Selperkatinib ska sättas ut permanent om patienten inte tolererar 40 mg peroral dos 2 gånger dagligen.

Biverkningar

- Observans på luftvägssymtom
- Hematologisk toxicitet
- Levertoxicitet
- Förstoppning och diarré. illamående, buksmärtor och smakrubbningar

- Fatigue

[Patientinformation](#)

Körschema

Att göra	
1	Skriv recept + säkerställ att patienten vet hur han/hon skall ta kapslarna. Informera om att varan kan ta tid att beställa hem från lokalt apotek.