

Bröst NabPaclitaxel 125 mg/m²

Cytodose= "Bröst Nab Paclitaxel 125 mg/m²" Cykellängd (kurintervall) 7 d

Indikation Bröst, adjuvant

Behandling

	Substans(preparat)	Dos/administrerings-tillfälle	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Nab Paclitaxel	125 mg/m ²	1	1	i.v.	1

	Substans/dag	1	Dag 8 ny cykel/kur
A	Nab Paclitaxel	A	

Övrigt

[Antiemetika vid behov](#)

Monitorera perifer neuropati (enbart Nab-Paclitaxel behöver dosreduceras), hudtoxicitet och mukosit/diarréer. Se FASS för specifika råd om dosreduktioner/uppehåll vid grad 2-4 toxicitet.

Beroende på Nab-Paclitaxeldos varierar volymen i påsen. (Apoteket tillsätter ordinerad volym till en tom steril påse, och skriver på etiketten hur många ml som påsen innehåller)

Dosreduktion avseende hematologi individanpassas

[Provtagning](#)

Dosreduktion - adjuvant

Substans	Neutrofila	TPK
	<1,0	< 100
NabPaclitaxel	Behandlingen uppskjutes	Behandlingen uppskjutes

[Patientinformation](#) (21 dgr)

Körschema NabPaclitaxel

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat

2	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter		Cytodose
4	Nab- Paclitaxel späds i Natriumklorid 9 mg/ml, beroende på Nab-Paclitaxeldos varierar volymen i påsen. Apoteket tillsätter aktuell volym till en tom steril påse, och skriver på etiketten hur många ml som påsen innehåller. Starta Nab-Paclitaxelinfusionen och spola snabbt in max 20 ml, detta för att fylla aggregatet med verksam substans.	20 minuter, därefter 20 ml Nacl på 10 min.	Cytodose