

Uro Cisplatin- Gemcitabin 21d

Cytodose= "Uro Cisplatin-Gemcitabin DAG 1,8 21 d" Kurintervall 21 dagar

Indikation Urinblåsecancer - palliativ eller alternativ neoadjuvant. Vid gott AT och GFR >60
"Cispaltin-fit"

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Gemcitabin (Gemzar)	1000	1	3	i.v.	1,8
B	Cisplatin (Platinol)	70	1	1	i.v	1

	Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	Paus dag 9-21	Dag 22 ny cykel/kur
A	Gemcitabin	A	-	-	-	-	-	-	A	-	
B	Cisplatin	B	-	-	-	-	-	-	-	-	

Övrigt

- Dag 8 skjuts ej upp. Om man inte kan ge denna hoppar man över, och fortsätter behandling dag 1.
- [Antiemetika högemetogen](#) Dag 1. Dag 8 vid behov.
- DAG 8 ordinera T. Betapred 16 tabletter (8 mg) inför behandling (för att förebygga influensaliknande symtom).
- Audiogram
- Iohexolclearance.
- [Perifer neuropati - monitorering](#)
- Aminoglykosider skall ej ges under och 1 månad efter cisplatinbehandling
- Vid påtaglig hörselnedsättning eller tinnitus överväg att ersätta cisplatin med karboplatin.
- [Rutinmässig provtagning](#)

Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC -gradering

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	Grad 4
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen
Grad II	Återuppta (fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen
Grad III	Återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen	
Grad IV	Avsluta behandlingen			

Dosreduktion hematologi

Substans	Neutrofila	TPK
	< 1,5	<100

Båda preparaten	Behandlingen uppskjutes i en vecka.	Behandlingen uppskjutes i en vecka.
-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Patientinformation

- [Antiemetikaschema Högemetogen och dag 8 \(influensaliknande symtom\)](#)

Körschema Cisplatin-Gemcitabin urogenital dag 1

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Prehydrering 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml eventuellt med tillsatser (se länk) som intravenös infusion	2 timmar	Cytodose
2	Kontrollera att patienten har tagit antiemetika.		Cytodose
3	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter respektive läkemedel		
4	Ge Gemcitabin spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	30 minuter	Cytodose
6	Ge Cisplatin spädd i 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	2 timmar	Cytodose
7	Posthydrering 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	2 timmar	Cytodose

Körschema Cisplatin-Gemcitabin urogenital dag 8

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Kontrollera att patienten tagit Betapredtabletter		Cytodose
2	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter respektive läkemedel		
3	Ge Gemcitabin spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	30 minuter	Cytodose