

Bröst CX Cyklofosfamid- Capecitabin p.o. 21 d

Cytodos: "Bröst Cyklofosfamid-Kapecitabin (CX) 21 d" Kurintervall: 21 dagar

Indikation: palliativ

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings- tillfälle	Antal administrerings- tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Cyklofosfamid	50 mg standarddos	1	21	p.o.	1-21
B	Capecitabin (Xeloda)	500 mg standarddos	3	63	p.o.	1-21

Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Dag 22 ny kur
A Cyklofosfamid	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
B Capecitabin	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	

Övrigt

- Testa för DPYD-brist innan preparatet ges.
- [Antiemetika vid behov](#)
- [Att förebygga och behandla Hand-fotsyndromet](#)
- EKG vid anamnes på hjärtsjukdom.
- [Provtagning, rutinmässig.](#)

Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC -gradering

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4:e gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen
Grad II	Gör uppehåll och återuppta (fulldos) vid tox grad 0-I	Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I	Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I	Avsluta behandlingen
Grad III	Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I	Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I	Avsluta behandlingen	
Grad IV	Avsluta behandlingen			

[Biverkningar - gradering av toxicitet i samband med behandling av capecitabin](#)

Dosreduktion hematologi

Neutrofila	TPK	Capecitabin	
> 1,5	>75	100 %	
1,1 - 1,5	50 - 75	50-75 %	
≤ 1,0	< 50	Behandlingen uppskjutes en vecka. Överväg dosreduktion vid nästa kur.	

Patientinformation

Körschema dag 1- 21

1	Skriv ut medicinlista från ELAS	
2	Lämna tabletter och medicinlistan till patienten. Informera patienten om att han/hon skall svälja capecitabin (Xeloda) hela tillsammans med måltid eller med vatten inom 30 minuter efter avslutad måltid, samt att ta doserna med ca 12 timmars intervall.	Cytodos

Anmärkningar

Provtagning och telefonkontakt med patienten dag 8 i cykel nr 1, därefter vid behov. Uppföljning med avseende på hand-fot syndrom och övrigt enligt NCIC-gradering via telefon med sjuksköterska dag 8 serie 1, samt vid varje besök.