

GI FLOX 14 d

Kurintervall: 14 dagar

Indikation: Metastaserande colorektalcancer. Inoperabel eller metastaserande pancreascancer/ ventrikeltcancer. Esofaguscancer.

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings- tillfälle mg/m ²	Antal administrerings- tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Oxaliplatin	85	1	1	i.v.	1
B	Fluorouracil (5-FU)	500	1	2	i.v.	1,2
C	Kalciumfolinat	60	1	2	i.v.	1,2

	Substans/dag	1	2	Paus dag 3-14	Dag 15 ny cykel/kur
A	Oxaliplatin	A	-	-	
B	Fluorouracil	B	B	-	
C	Kalciumfolinat	C	C	-	

Övrigt

- Testa för DPYD-brist innan behandling ges.
- [Antiemetika: medeleemetogent](#)
- Profylax mot IRR (infusionsrelaterad reaktion) av oxaliplatin: 1 g paracetamol + 10 mg Desloratadin en timme före start av behandling.
- nför kur 4 och varje efterföljande kur ska sjuksköterska ringa patienten före ordination och efterhöra neuropatier. Dokumenteras i journalen. Nedan finns skattningsskala till hjälp.
- [Nervpåverkan i samband med behandling av oxaliplatin](#)
- [Provtagning](#)

Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC -gradering

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4:e gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen
Grad II	Gör uppehåll och återuppta (fulldos) vid tox grad 0-I	Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I	Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I	Avsluta behandlingen

Grad III	Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I	Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I	Avsluta behandlingen	
Grad IV	Avsluta behandlingen			

[Biverkningar - gradering av toxicitet i samband med behandling av fluorouracil](#)

Dosreduktion hematologi

Neutrofila	TPK	Fluorouracil	Oxaliplatin	Calciumfolinat
≥ 1,5	≥100	100 %	100 %	100 %
	75-99	50-75 %	50-75 %	100 %
< 1,5	<75	Behandlingen uppskjutes 3-7 dagar. Överväg dosreduktion vid nästa kur.		

Dosreduktion neuropati

Biverkningar	Duration av biverkningar		Bestående biverkningar mellan behandlingarna
	1-7 dagar	> 7 dagar	
Dysestesier med köldkänsla	Ingen dosändring	Ingen dosändring	Ingen dosändring
Parestesier	Ingen dosändring	Ingen dosändring	Behandlingen avbryts
Parestesier med smärta	Ingen dosändring	1:a gång: sänk dos 25 % 2:a gång: sänk dos 25 % 3:e gång: Avbryt	Behandlingen avbryts
Parestesier med funktionsnedsättning	Ingen dosändring	1:a gång: sänk dos 50 % 2:a gång: Avbryt	Behandlingen avbryts

- [Patientinformation FLOX](#)
- [Antiemetikaschema: Medelemetogen + allergiprofylax](#)

Körschema Dag 1

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Kontrollera att patienten tagit antiemetika och IRR-profylax (infusionsrelaterad reaktion profylax)		
2	Akutvagn tillgänglig		
3	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och		

	efter respektive läkemedel		
4	Ge Oxaliplatin spädd i 500 ml Glukos 50mg/ml	1 timme	Cytodos
5	Ge Fluorouracil spädd i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml intravenöst	5-10 min	Cytodos
6	Paus (låt spoldroppet gå)	30 minuter	
7	Ge Kalciumfolinat som intravenös bolusinjektion	3-5 min	Cytodos

Körschema Dag 2

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Kontrollera att patienten tagit antiemetika		
2	Sätt spoldropp 250 ml natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter respektive läkemedel		
3	Ge Fluorouracil spädd i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml intravenöst	5-10 min	Cytodos
4	Paus (låt spoldroppet gå)	30 minuter	
5	Ge Kalciumfolinat som intravenös bolusinjektion	3-5 min	Cytodos

Anmärkningar

- Oxaliplatin kan vid biverkningar ges på 2 timmar istället för 1 timme