

GI Nivolumab 3mg/kg 14 d

Kurintervall 14 dagar

Indikation: Esofaguscancer, skivepitel (andra linjen efter progress på kombination 5-Fu/platinum)

Ventrikel- eller esofaguscancer, adenocarcinom. Nivolumab ges i kombination med 5-Fu/Oxaliplatin)

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrering- tillfällen/dygn	Doser/cyke l	Ad m	Dag
A	Nivolumab	3mg/kg (maxdos 240mg)	1	1	i.v.	1
	Substans/dag	1	Paus dag 2- 14	Dag 15 ny cykel		
A	Nivolumab	A	-			

Behandlingen pågår tills patienten progredierar eller får biverkningar som kräver utsättning

Övrigt

- [Biverkningshantering](#) och [Kontaktuppgifter till konsult](#)
- Vid infusionsreaktion som t.ex. feber, frossa eller värk bör Paracetamol 1000 mg och Desloratadin 5 mg ges. Detta kan också övervägas att ges som premedicinering inför behandlingar därefter.
- Patient med TB eller Hepatit-anamnes, kontakta infektion
- Provtagning Immunoterapi singel

Biverkningar

Grad I	Symtomatisk behandling
Grad II	Uppehåll med behandling. Steroid behandling motsvarande Prednisolon 1-2 mg/kg per dag. Reduceras när biverkningar är grad I, minst 4 veckors steroidbehandling
Grad III- IV	behandlingen utsättes permanent. Metylprednisolon i.v. 125 mg dag 1, därefter Prednisolon 1-2 mg/kg per dag p.o. Om ej svar på prednisolon ge Infliximab (Remicade) 5 mg/kg x 1

Biverkningar ska rapporteras som Events of Clinical Interest och SAE

Patientinformation

[Patientinformation Nivolumab](#)

Körschema

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		-
2	Akutvagn tillgänglig		
3	Ge Nivolumab intravenöst spädd i 100 Natriumklorid 9 mg/ml	30 minuter	Cytodose

Anmärkningar

Sköterskekontakt en vecka efter behandling, därefter individuell bedömning.
Kontroll av immunrelaterade biverkningar som främst rör GI, lever, hud, neurologi och endokrina system.