

GI Teysuno-S1 mono 21d

Cykellängd (kurintervall) 21 dagar

Cytodose: "GI Teysuno S1 21d"

Indikation: Esofagus, ventrikel och Kolorektalcancer.

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings- tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings- tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	S1 (Teysono)	30	2*	28	p.o.	1- 14*

Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14*	Paus dag 15*-21	Dag 22 ny cykel/kur
A S1 (Teysono)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	

Övrigt

- [Antiemetika lågemetogen](#)
- Vid anamnes på hjärtsjukdom, ta EKG före behandling.
- Försiktighet vid nedsatt njurfunktion. Om estimerat GFR 30-49 ml/minut så reducera med 5 mg/m² eller överväg alternativ/likvärdig regim, se FASS.
- [Provtagning, rutinmässig](#)

Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC-gradering

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4:e gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen
Grad II	Gör uppehåll och återuppta (fulldos) vid tox grad 0-I	Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I	Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I	Avsluta behandlingen
Grad III	Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I	Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I	Avsluta behandlingen	
Grad IV	Avsluta behandlingen			

Dosreduktion hematologi

Neutrofila	TPK	Teysuno	
> 1,5	>75	100 %	
1,1 - 1,5	50 - 75	75 %	
≤ 1,0	< 50	Behandlingen uppskjutes en vecka. Överväg dosreduktion vid nästa kur.	

Patientinformation

[Patientinformation Teysuno](#)

Körschema

1	Skriv ut medicinlista från ELAS	
2	Lämna tabletter och medicinlistan till patienten. Kapslarna intas morgon och kväll minst 1 timme före och 1 timme efter måltid. Obs, de ska inte tas i samband med måltid!	Cytodose

Anmärkningar

Telefonkontakt med sjuksköterska dag 8 kur 1.