

Lung Alektinib (Alecensa)

Kontinuerlig behandling. Tyrosinkinashämmare.

Indikation

Alecensa är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna patienter med anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv, avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som tidigare behandlats med crizotinib (Xalkori). Underhållsbehandling.

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm
A	Alektinib (Alecensa)	600 mg	2	Kontinuerlig behandling	p.o.

Kapselstyrka: 150 mg

Administrering

- Inför start:
Provtagning: Blod-, njur- och leverstatus inkl ASAT, CK, CRP
- EKG och blodtryck

Uppföljning

- Provtagning efter 1, 2 och 4 veckor. Därefter 1 gång i månaden, kan sedan glesas ut om stabilt.
- EKG och blodtryck efter 2 och 4 veckor. Därefter vid läkarbesök.
- Telefonuppföljning av sjuksköterska efter 2 veckor
- Läkarbesök (klinisk kontroll) efter ca 4 veckor

Övrigt

- Kapslarna ska sväljas hela, helst med vatten och inte krossas, delas eller tuggas. Med mat.
- Om en dos skulle missas: om >6 timmar till nästa dos ska missad dos tas så fort som möjligt dock inte om <6 timmar till nästa dos. Patienten ska INTE ta 2 doser samtidigt som kompensation.
- Undvik samtidigt intag av grapefruk eller grapefruktjuice (ökad plasmakoncentrationer av Alecensa) under behandlingstiden.
- Undvik långvarig solexponering samt att använda solkräm.
- Dosreducera om patienten inte tål preparatet: 1:a dosreduktionen: 450 mgx2. 2:a dosreduktionen 300 mgx2. 3:e dosreduktionen: Behandling avbryts.

Biverkningar

Informera om allvarliga biverkningar:

- Leverpåverkan (förhöjda värden kan leda till minskad aptit, guldfärgad hud och ögonvitor, klåda, mörk urin, illamående eller kräkning, smärta i bukens högersida, blödningar eller blåmärken.

- Bradykardi som kan ge ostadighet/yrsel
- Muskelsmärta
- Lungproblem

Informera om mycket vanliga biverkningar:

- Trötthet, förstoppning och svullna händer, fötter, anklar eller ögonlock.

Övrigt

- Labprover, se nedan under uppföljning, ska tas så nära före den första dosen Alecensa som möjligt.
- Behandling fortsätter till tumörprogress.
- Alecensa kan passera blod-hjärnbarriären och stanna kvar i CNS. Jämfört med Xalkori visar studier att Alecensa minskar risken för tumörer att sprida till, eller växa i, hjärnan eller i CNS.

Patientinformation

Körschema,

Att göra	
1	Skriv recept + säkerställ att patienten vet hur han/hon skall ta kapslarna. Informera om att varan kan ta tid att beställa hem från lokalt apotek.