

Uro Docetaxel - Karboplatin 21d

Kurintervall: 21 dagar

Cytodose: "Gyn Docetaxel–Karboplatin" (finns ej på uro)

Indikation: Prostata, metastaserad kastrationsresistent (mCRPC) med neuroendokrin differentiering

| | Substans (preparat) | Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ² | Antal administrerings-tillfällen/dygn | Doser/cykel/kur | Adm | Dag |
|---|--------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|------|-----|
| A | Docetaxel (Taxotere) | 75 | 1 | 1 | i.v. | 1 |
| B | Karboplatin (Paraplatin) | AUC =5* | 1 | 1 | i.v. | 1 |

* Calverts formel Dos (mg)=(planerad AUC) x (GFR ml/min + 25)

| | Substans/dag | 1 | Behandlingsfritt dag 2-21 | Ny kur dag 22 |
|---|--------------|---|---------------------------|---------------|
| A | Docetaxel | A | | |
| B | Karboplatin | B | | |

Övrigt

- Iohexolclearance. OBS! Använd alltid det okorrigerade värdet =absolut för dosering av karboplatin
- [Antiemetika högmetogen](#)
- Allergiprofilax: Premedicinering med kortison motsvarande tablett Betametason:
- Premedicinering med kortison motsvarande tablett Betametason: : 1 tim före behandling tas
Betapred 16 tabletter = 8 mg. Dagen efter behandling; på morgonen tas Betapred 8 tabletter= 4mg
- Ordinera Prednisolon 10 mg 1x1 kontinuerligt
- [Provtagning](#)

Dosreduktion

| Substans | Neutrofila | TPK |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | < 1,5 | <100 |
| Docetaxel+Karboplatin | Behandlingen uppskjutes i 1 vecka | Behandlingen uppskjutes i 1 vecka |

Patientinformation

[Patientinformation Karboplatin-Docetaxel](#) (obs äggstockscancer)

[Allergiprofilax](#)

Körschema

| Att göra | Infusionstid | Var ordinerat |
|--|--------------|---------------|
| Akutvagn tillgänglig | | |
| Kontrollera att patienten tagit allergiprofylax enl. ovan (se under övrigt) samt antiemetika | | - |
| Sätt spoldropp 500 ml Natriumklorid för spolning före och efter respektive läkemedel | | - |
| Ge Docetaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion | 1 timme | Cytodose |
| Ge Karboplatin spädd i 500 ml Glukos 50 mg/ml som intravenös infusion | 30 minuter | Cytodose |