

## **Uro Docetaxel - Carboplatin 21d**

**Kurintervall: 21 dagar**

**Cytodose: "Gyn Docetaxel–Karboplatin" (finns ej på uro)**

**Indikation: Prostata, metastaserad kastrationsresistent (mCRPC) med neuroendokrin differentiering**

	<b>Substans (preparat)</b>	<b>Dos/administrerings- tillfälle, mg/m<sup>2</sup></b>	<b>Antal administrerings- tillfällen/dygn</b>	<b>Doser/cykel/kur</b>	<b>Adm</b>	<b>Dag</b>
A	Docetaxel (Taxotere)	75	1	1	i.v.	1
B	Karboplatin (Paraplatin)	AUC =5*	1	1	i.v.	1

\* Calverts formel Dos (mg)=(planerad AUC) x (GFR ml/min + 25)

	<b>Substans/dag</b>	<b>1</b>	<b>Behandlingsfritt dag 2-21</b>	<b>Ny kur dag 22</b>
A	Docetaxel	A		
B	Karboplatin	B		

### **Övrigt**

- Iohexolclearance. OBS! Använd alltid det okorrigerade värdet =absolut för dosering av carboplatin
- [Antiemetika högmetogen](#)
- Allergiprofylax: Premedicinering med kortison motsvarande tablett Betametason:
- Premedicinering med kortison motsvarande tablett Betametason: : 1 tim före behandling tas Betapred 16 tablett = 8 mg. Dagen efter behandling; på morgonen tas Betapred 8 tablett= 4mg
- Ordinera Prednisolon 10 mg 1x1 kontinuerligt
- [Provtagning](#)

### **Dosreduktion**

<b>Substans</b>	<b>Neutrofila</b>	<b>TPK</b>
	< 1,5	<100
Docetaxel+Karboplatin	Behandlingen uppskjutes i 1 vecka	Behandlingen uppskjutes i 1 vecka

### **Patientinformation**

[Patientinformation Carboplatin-Docetaxel](#) (obs äggstockscancer)

[Allergiprofylax](#)

### **Körschema**

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
Akutvagn tillgänglig		
Kontrollera att patienten tagit allergiprofylax enl. ovan (se under övrigt) samt antiemetika		-
Sätt spoldropp 500 ml Natriumklorid för spolning före och efter respektive läkemedel		-
Ge Docetaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	1 timme	Cytodose
Ge Karboplatin spädd i 500 ml Glukos 50 mg/ml som intravenös infusion	30 minuter	Cytodose