

## Bröst Trastuzumab subkutant 21 d

Cytodose="Bröst Trastuzumab SUBCUTANT" Kurintervall: 21 dagar

### Indikation

Bröstcancer HER2 positiv efter adjuvant cytostatika eller palliativt

### Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Subcutan Trastuzumab (Herceptin)	600 mg (Fast dos)	1	1	s.c	1

	Substans/dag	1	Dag 2-21 Behandlingsuppehåll	Dag 22 ny cykel/kur
A	Subcutan Trastuzumab	A		

### Övrigt

- Alternativ till i.v Trastuzumab
- Ingen laddningsdos krävs
- Vid adjuvant behandling - UKG var 3:e månad. Skicka remiss för baseline undersökning OCH itererad remiss för riktad kontrollundersökning. Datum för första UKG samt baseline/utgångs EF (ejektionsfraktion) skall dokumenteras i canceröversikten under rubriken "undersökningsresultat till onkologisk översikt" av den läkare som signerar svaret.
- Vid palliativ behandling - UKG 1 gång/år och vid symtom
- Vid trastuzumab-reaktion ordinera premedicinering: T. Desloratadin 5 mg, T. paracetamol 1 g, 1-3 timmar före start.
- Dosen 600 mg ska enbart administreras som en subkutan injektion under 2-5 minuter. Injektionsstället bör alterneras mellan vänster och höger lår. Injektionen bör ges med minst 2,5 cm avstånd till tidigare injektionsställe, och aldrig i områden där huden är röd, har blåmärken, är öm eller hård.
- Ingen rutinmässig provtagning.

Dosreduktion ej aktuellt

### Patientinformation

### Körschema

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
Akutvagn tillgänglig		

Kontrollera blodtryck före behandlingsstart vid de två första behandlingstillfällena		
Ge Subcutan Trastuzumab	2-5 minuter	Cytodose
Patienten ska stanna kvar för observation 2 timmar efter avslutad behandling, vid första behandlingstillfället. Patienter som fått intravenöst Trastuzumab innan det ges subcutant behöver INTE stanna kvar efter 1:a subcutana dosen.		