

## Uro Docetaxel - Abirateron ("triplett-behandling") 21 d

Cytodose= "Uro Docetaxel 75 21d"

Kurintervall: 21 dagar

Indikation: *de novo* metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC), högvolum\*

### Behandling

|   | Substans (preparat)  | Dos/administrerings-tillfälle, mg/m <sup>2</sup> | Antal administrerings-tillfällen/dygn | Doser/cykel/kur | Adm  | Dag  |
|---|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------|------|
| A | Docetaxel (Taxotere) | 75                                               | 1                                     | 1               | i.v. | 1    |
| B | Abirateron           | 1000                                             | 1                                     | 21              | p.o. | 1-21 |

|   | Substans/dag | 1 | Dag 2-21               | Dag 22 ny cykel/kur |
|---|--------------|---|------------------------|---------------------|
| A | Docetaxel    | A | behandlingsuppehåll    |                     |
| B | Abirateron   | B | dag 2-21 kontinuerligt |                     |

\* definition högvolum:  $\geq 4$  skelettmetastaser, *eller* 1-3 skelettmetastaser varav någon utanför axialskelettet, *eller* visceral metastaser

### Övrigt

- [Flödesschema](#)

#### Docetaxel

- [Antiemetika lågemetogen](#)
- Premedicinering med kortison motsvarande tablett Betametason: : 1 tim före behandling tas Betapred 16 tabletter = 8 mg. Dagen efter behandling; på morgonen tas Betapred 8 tabletter= 4mg
- Ordinera Prednisolon 10 mg 1x1 kontinuerligt. Efter avslutad Docetaxel sänks Prednisolondosen till 5mg (så länge patienten kvarstår på Abirateron).
- Ges i 6 kurer
- Överväg g-csf-tillägg vid isolerad neutropeni

#### Abirateron

- Receptförskrivning för EN månad i taget.
- Dosering i förhållande till måltid: Tas på fastande mage. Johannesört får ej intas under pågående behandling. Vid missad dos, ta din vanliga dos nästa dag.
- Ges med zoledronsyra **5 mg** årlig infusion (dosreducera om nedsatt njurfunktion alternativt ge denosumab 60 mg var 6:e månad) + kalk/vit D-tablett
- Ges tills progress/oacceptabla biverkningar
- Blodtrycksmätning inför varje kur därefter var tredje månad
- [Provtagning](#) (avbryts Docetaxel i förväg tas prover enligt singelbehandling Abiraterone). Därefter blodstatus, njurstatus, leverstatus inkl. ASAT var 3:e månad om patienten går kvar på onkologen.

### Dosreduktion

| Substans  | Neutrofila                        | TPK                               |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|           | < 1,5                             | <100                              |
| Docetaxel | Behandlingen uppskjutes i 1 vecka | Behandlingen uppskjutes i 1 vecka |

### Patientinformation

- [Schematisk behandlingsplan](#)
- Patientinformation [Docetaxel](#) + [Abirateron](#)
- [Allergiprofylax](#)

### Körschema

|   | Att göra                                                                    | Infusionstid | Var ordinerat |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|   | Akutvagn tillgänglig. Blodtryckskontroll inför varje ny kur                 |              |               |
| 1 | Kontrollera att patienten tagit allergiprofylax enl. ovan (se under övrigt) |              |               |
| 2 | Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning                            |              |               |
| 4 | Ge Docetaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion   | 60 minuter   | Cytodose      |