

Uro Docetaxel - Abirateron ("triplett-behandling") 21 d

Cytodose= "Uro Docetaxel 75 21d"

Kurintervall: 21 dagar

Indikation: *de novo* metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC), högvolymlig*

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Docetaxel (Taxotere)	75	1	1	i.v.	1
B	Abirateron	1000	1	21	p.o.	1-21

	Substans/dag	1	Dag 2-21	Dag 22 ny cykel/kur
A	Docetaxel	A	behandlingsuppehåll	
B	Abirateron	B	dag 2-21 kontinuerligt	

* definition högvolymlig: ≥ 4 skelettmetastaser, *eller* 1-3 skelettmetastaser varav någon utanför axialskelettet, *eller* visceral metastaser

Övrigt

- [Flödesschema](#)

Docetaxel

- [Antiemetika lägemetogen](#)
- Premedicinering med kortison motsvarande tablett Betametason: : 1 tim före behandling tas Betapred 16 tabletter = 8 mg. Dagen efter behandling; på morgonen tas Betapred 8 tabletter= 4mg
- Ordinerar Prednisolon 10 mg 1x1 kontinuerligt. Efter avslutad Docetaxel sänks Prednisolondosen till 5mg (så länge patienten kvarstår på Abirateron).
- Ges i 6 kurer
- Överväg g-csf-tillägg vid isolerad neutropeni

Abirateron

- Receptförskrivning för EN månad i taget.
- Dosering i förhållande till måltid: Tas på fastande mage. Johannesört får ej intas under pågående behandling. Vid missad dos, ta din vanliga dos nästa dag.
- Ges med zoledronsyra **5 mg** årlig infusion (dosreducera om nedsatt njurfunktion alternativt ge denosumab 60 mg var 6:e månad) + kalk/vit D-tablett
- Ges tills progress/oacceptabla biverkningar
- Blodtrycksmätning inför varje kur därefter var tredje månad
- [Provtagning](#) (avbryts Docetaxel i förväg tas prover enligt singelbehandling Abiraterone). Därefter blodstatus, njurstatus, leverstatus inkl. ASAT var 3:e månad om patienten går kvar på onkologen.

Dosreduktion

Substans	Neutrofila	TPK
	< 1,5	<100
Docetaxel	Behandlingen uppskjutes i 1 vecka	Behandlingen uppskjutes i 1 vecka

Patientinformation

- [Schematisk behandlingsplan](#)
- Patientinformation [Docetaxel](#) + [Abirateron](#)
- [Allergiprofylax](#)

Körschema

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
	Akutvagn tillgänglig. Blodtryckskontroll inför varje ny kur		
1	Kontrollera att patienten tagit allergiprofylax enl. ovan (se under övrigt)		
2	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning		
4	Ge Docetaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	60 minuter	Cytodose