

Lung Topotekan i.v. 21 d

Cytodose: "Lung Topotekan 21 d"

Kurintervall: 21 dagar

Indikation: Småcellig lungcancer. Second line.

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Topotekan (Hycamtin)	1,5	1	5	i.v.	1,2,3,4,5

	Substans/dag	1	2	3	4	5	Dag 6-21 behandlingsuppehåll	Dag 22 ny cykel
A	Topotekan (Hycamtin)	A	A	A	A	A	-	

Övrigt

- Apoteket har inte detta i lager. Beställ i god tid innan patienten kommer.
- Antiemetika: T. Betapred 0,5 mg 6 st inför behandlingen (3mg) och T. Ondansetron 8 mg, ordineras i Cytodose.
- GFR ska vara > 60ml/min
- Antal cykler = 4
- [Provtagning](#)

Dosreduktion - hematologi

Substans	Neutrofila	TPK
	< 1,5	< 100
Topotekan	Behandlingen uppskjutes i en vecka	Behandlingen uppskjutes i en vecka

[Patientinformation](#)

Körshema dag 1-5

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1.	Kontrollera att patienten har tagit antiemetika.		Cytodose
2.	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		-

3.	Ge Topotekan spädd i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	30 minuter	Cytodose
----	---	------------	----------