

Att tänka på efter röntgenundersökningar med intravaskulära kontrastmedel, instruktion till vårdgivare, röntgen Region Jönköpings län

Hydrering

För att förhindra påverkan på njurfunktionen bör patienten hållas väl hydrerad dygnet efter undersökningen.

Metforminbehandlade patienter

För patienter med GFR <45 ska Metformin sättas ut i samband med undersökningen och S-Kreatinin kontrolleras, tidigast 48 timmar efter undersökningen. Remitterande läkare beslutar därefter om Metforminpreparat kan återinsättas.

Uppföljning av övriga riskpatienter

Kontroll av S-Kreatinin för dessa riskpatienter rekommenderas 2–4 dagar efter undersökning.

Allergiska reaktioner

I sällsynta fall kan kontrastmedel ge upphov till allergiska reaktioner inom 1 dygn och upp till 1 vecka efter undersökningen. Vid misstanke om anafylaktisk reaktion rekommenderas att ta serumtryptas inom ½–3 timmar efter reaktionen, för att bekräfta att det rör sig om äkta kontrastmedelsreaktion.

Rapportering av biverkningar

Rapportera biverkningar som njurpåverkan, extravasering, kontrastmedelsreaktioner o.s.v. till röntgen för dokumentation i röntgens journalsystem.