

Lung Nintedanib (Vargatef)

Kontinuerlig behandling. Tyrosinkinashämmare.

Indikation

Behandling av vuxna med lokalt avancerad, metastaserande eller lokalt recidiverande icke småcellig lungcancer (NSCLC), efter första linjens behandling med kemoterapi. Vargatef blockerar effekten av tillväxthormon PDGF-, FGF- och VEGF-receptorer

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm
A	Nintedanib (Vargatef)	200 mg	2	Kontinuerlig behandling	p.o.

Kapselstyrkor: 100 mg samt 150 mg

Administrering

- Vargatef ges initialt i kombination med kemoterapi, Docetaxel, i 4 kurer. Dock ges det ej på samma dag som Docetaxel ges. Därefter ges endast Vargatef som underhållsbehandling.
- Provtagning: Blodstatus + neutrofila, njurstatus, leverstatus inkl ASAT vid läkarbesöken.
- Vargatef får ej ges till patienter som är allergiska mot jordnötter och soja.
- Kapslar sväljes hela med vatten, i samband med måltid. Får inte tugga, krossas eller delas.
- Vid missad dos ska nästa tas som planerat, aldrig 2 doser samtidigt!

Biverkningar

Informera om mycket vanliga biverkningar:

- Diarré
- Illamående och kräkningar
- Leverpåverkan

Övrigt

[Patientinformation](#)

Körschema

	Att göra
1	Skriv recept + säkerställ att patienten vet hur han/hon skall ta kapslarna. Informera om att varan kan ta tid att beställa hem från lokalt apotek.