

Uro Cabozantinib (Cabometyx) p.o.

Cytodose= saknas

Cykellängd: Kontinuerlig

Indikation: Njurcellscancer i tidigast 2:a linjen. Ska diskuteras intern innan insättning

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Dygns dos	Adm
A	Cabozantinib	60	1	60 mg	per oral

Övrigt

- Skrivs på recept
- Dosreduktion behövs oftast. Dosbekräftas av läkare inför start av ny kur
- Tabletter finns i styrkorna 20,40 och 60 mg
- Blodtryck 1 ggr/vecka i 8 veckor, sedan 1 ggr/ månad. Patienten kan ta blodtryck på vårdcentralen alt. med egen blodtrycksmätare i hemmet. Be patienten höra av sig till kontaktsjuksköterska om blodtrycket överskrider 160/100 mmHg.
- Provtagning: Infart start: Blodstatus, p-glukos, TSH, T4, njurstatus, leverstatus, magnesium
Varannan vecka: Blodstatus, leverstatus. Var 4:e vecka: njurstatus, magnesium, p- glukos
Var 2-3: månad: TSH, T4
Efter 1-3 månader görs individuell bedömning om proverna kan glesas ut
- Interaktioner, se [FASS](#)
- [Att förebygga och behandla hand-fotsyndrom](#)

Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC -gradering

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4: gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen
Grad II	Återuppta (fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (75% av fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (50% av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen
Grad III	Återuppta (75% av fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (50% av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen	
Grad IV	Avsluta behandlingen			

- Biverkningmonitorering, [Checklista](#)

Patientinformation

Cabozantinib (Cabometyx)

	Att göra	Var ordinerat
1.	Informera patient om behandlingen. Patient får recept	

Uppföljning, Cabozantinib (Cabometyx)

	Att göra	Var ordinerat
1.	Tablettbehandling, compliance Planera återbesök vid behov	
3.	Om patienten avbryter behandlingen - be hen ta med resterande läkemedel tillbaka (enligt rutiner för kliniska prövningar)	

Anmärkningar

- Cabozantinib ska tas efter minst 2 timmars fasta innan och 1 timme efter
- Grapefrukt, grapefruktjuice och johannesörtspreparat får ej intas under vid behandling
- Information; uppmärksam på hand - fot syndrom och huvudvärk (blodtrycksstegring)