

MR Gyn, instruktion till remittent, röntgen Region Jönköpings län

Endometrios, cervix, corpus, uterus, vulva och lilla bäckenet.

Kontraindikationer

Ifyllt och undertecknat frågeformulär inför MR-undersökning, se separata frågeformulär:

- ”Frågeformulär inför MR-undersökning”
- ”Frågeformulär inför MR-undersökning barn”
- ”Frågeformulär inför MR-undersökning inneliggande patient”
- ”Frågeformulär inför MR-undersökning medföljande anhörig/personal”.

Inneliggande patient

Frågeformuläret fylls i i samband med att remissen skrivs. **Är någon fråga besvarad med JA kontakta MR-sektionen direkt** så att eventuell operationsberättelse kan beställas och gås igenom innan en MR-undersökning kan bli aktuell.

Poliklinisk patient

Frågeformuläret skickas hem till patienten tillsammans med kallelsen och patienten uppmanas ringa MR-sektionen om denne svarar JA på någon av frågorna.

Patienter med en del pacemakermodeller och vissa implantat kan inte undersökas med MR. Patient med MR-villkorlig ICD undersöks i Jönköping i samarbete med pacemakermottagningen.

Diabetiker med insulinavkännare och/eller insulinpump måste avlägsna dessa inför MR undersökningen.

Observera att det kraftiga magnetfältet alltid är påslaget, vilket medför att samma restriktioner gäller för medföljande personal/anhörig som för patient.

Förberedelser

- Ifyllt och undertecknat frågeformulär inför MR-undersökning ska tas med till MR undersökningen (se länk i högerkolumnen). Är någon fråga besvarad med JA kontakta MR-sektionen.
- Ett aktuellt kreatininvärde om kontrastmedel ingår i undersökningen, se dokument ”Intravaskulär gadoliniumkontrast vid MR-undersökning. Information för remitterande enheter”
- Patienten ska vara fastande i minst 4 timmar före sin undersökningstid.

- Patienten ska ta ett mikrolavemang (exempelvis Toilax) en timme före undersökningstiden. Gäller inte patienter med stomi.
- Ange om patienten har tolkbehov tydligt i remissen alternativt ta kontakt med MR-sektionen, se dokument, "Tolkbehov inför röntgenundersökning".
- Patienten ska inte ha mascara, ögonskugga, nagellack eller övrig kosmetika på sig.
- Bedöm patientens tillstånd. Patienten ska vara adekvat smärtlindrad. Oftast behövs extra smärtstillande vilket ska ges på vårdavdelningen alternativt skrivas ut inför MR-undersökning.
- Efter överenskommelse med MR-personal kan lugnande (Diazepam/Stesolid) ges intravenöst på MR-rummet, ta kontakt med MR-sektionen.
- Om undersökningen ska utföras i narkos måste detta framgå i remissen samt motivering till varför.
- Undvik vätskedrivande läkemedel om möjligt eftersom patienten ska klara av att ligga stilla i kameran under hela undersökningstiden.
- Patienten ska vara fastande 4 timmar innan undersökningen
- Patienten ska tömma tarmen med ett mikrolavemang 1 timma före ankomst till sjukhuset
- Vid vissa av undersökningarna ska patienten själv applicera en gel i vagina som tillhandahålls av personalen på plats på MR-sektionen
- Utrymmet i magnetkamerans tunnel är begränsat, 60 eller 70 cm i diameter, varför det kan bli problem med stora och bredaxlade patienter. Vid tveksamhet kontakta MR-sektionen.
- Patienten ska ha varit på toaletten inför MR undersökningen.
- Inga föremål som vi inte säkert vet är MR-kompatibla får tas med in i MR-rummet.

För inläggande patient gäller även följande

- Inför MR-undersökning där kontrastmedel ska injiceras krävs en venös infart. Denna ska vara satt på vårdavdelningen. Gärna en 20GA alternativt 22GA. Kontakta MR-sektionen om vilken nål som gäller för aktuell undersökning.
- Patienten ska vara fastande 4 timmar innan undersökningen
- Patienten ska tömma tarmen med ett mikrolavemang 1 timma före ankomst till MR-sektionen
- Vid vissa av undersökningarna ska patienten själv applicera en gel i vagina som tillhandahålls av personalen på plats på MR-sektionen.
- Om övervakning av patient är nödvändig krävs medföljande personal från vårdavdelningen. Ta kontakt med MR-sektionen i förväg.
- Om patienten inte klarar av att genomgå undersökning med hjälp av lugnande läkemedel och undersökningen bedöms nödvändig gör remittent/remitterande enhet narkosanmälan av patient till koordinatör på ATE. Se separat länk till operations- och intensivvårdsklinikens PM, "OP-anmälan vid akut MR-undersökning".

- Ta bort all utrustning som patienten tillfälligt kan vara utan, t.ex. EKG-elektroder, infusioner m.m.
- Vid MR-undersökningen finns möjlighet att ge patienten syrgas samt infusion (inte droppräknare) inne på undersökningsrummet om detta anses vara nödvändigt.
- Smycken, piercingar, klocka, plånbok, mobil och dylikt lämnas på avdelningen.
- Allt med metall i (t.ex. bh) tas av. Metall kan ge brännskada och ger störningar på bilderna.
- Patienten ska ha rena sjukhuskläder på sig.
- Uribag, stomipåsar och dylikt ska vara bytta/tömnda.

Hur går en undersökning till

Patienten får ligga plant på en brits som förs in i kamerans undersökningsutrymme, som är cirka en meter långt och har en diameter antingen 60 eller 70 cm. Aktuella undersökningsområdet kommer att vara i mitten av kameran. Kameran har belysning och är öppen i båda ändar. När bilderna tas hörs ett kraftigt knackande ljud från kameran och patienten kommer att förses med hörselskydd.

För att få bästa möjliga bildkvalitet är det viktigt att patienten ligger **alldeles stilla under tiden som bilderna tas**. Patienten har möjlighet att lyssna på radio under undersökningen.

Undersökningstiden är cirka **60 minuter**. En röntgensjuksköterska sköter kameran från ett rum bredvid och patienten kan mellan bildserierna kommunicera med röntgensjuksköterskan genom en mikrofon och högtalare. För att snabbt kunna påkalla personalens uppmärksamhet har patienten möjlighet att larma.

Vid undersökningen behöver kontrastmedel ges intravenöst. Kontrastmedel som används vid MR-undersökning innehåller gadolinium, inte jod.

Eftervård

Hänvisning till dokument ”Intravaskulär gadoliniumkontrast vid MR-undersökning. Information för remitterande enheter”.

Förändring sedan föregående version

- Ändrat till MR-villkorliga ICD undersöks endast i Jönköping, eftersom varje ort har rutiner för MR-villkorliga pacemakers numera.
- Lagt till även Diazepam som lugnande.
- Ändrat uppgift om storlek på kamerans tunnel.
- Justeras undersökningstiden nedåt till följd av kortare sekvenstider med DR.