

GI Capecitabin 21 d

Kurintervall 21 dagar

Indikation: GI, metastaserande colorectal cancer, adjuvant colorectal cancer

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Capecitabin (Xeloda)	1250 (d.v.s. 2500 mg/m ² per dygn)	2	28	p.o.	1-14

	Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Paus dag 15-21	Dag 22 ny cykel/kur
A	Capecitabin	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	

Övrigt

- Testa för DPYD-brist innan behandling ges.
- [Provtagning, rutinmässig](#). Kontroll av blodstatus, leverprover samt telefonkontakt av sjuksköterska med patienten inför dag 8 i cykel nr 1.
- [Antiemetika vid behov](#)
- [Att förebygga och behandla Hand-fotsyndromet](#)
- **Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC -gradering**

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4:e gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen
Grad II	Gör uppehåll och återuppta (fulldos) vid tox grad 0-I	Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I	Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I	Avsluta behandlingen
Grad III	Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I	Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I	Avsluta behandlingen	
Grad IV	Avsluta behandlingen			

[Biverkningar - gradering av toxicitet i samband med behandling av capecitabin](#)

Dosreduktion hematologi

Neutrofila	TPK	Capecitabin	
> 1,5	>75	100 %	
1,1 - 1,5	50 - 75	50-75 %	
≤ 1,0	< 50	Behandlingen uppskjutes en vecka. Överväg dosreduktion vid nästa kur.	

[Patientinformation Capecitabin](#)

Körschema

1	Skriv ut medicinlista från ELAS	
2	Lämna tabletter och medicinlistan till patienten	Cytodose