

GI Mitomycin - Fluorouracil -konkomitant, 28 d

Cytodose= "GI Mitomycin- Fluorouracil- konkomitant, 28d"

Kurintervall: 28 d

Indikation: Analcancer

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Mitomycin	10	1	1	i.v.	1
B	Fluorouracil (5-FU)	4000 mg/m ² (1000 mg mg/m ² /dygn)	-	1	i.v.	

	Substans/dag	1	2	3	4	5-28	Dag 29, ny cykel/kur
A	Mitomycin	A	-	-	-	-	
B	Fluorouracil	B	B	B	B	-	

Övrigt

- [Antiemetika, medelemetogen](#)
- Strålbehandling start samma dag (dag 1) som den medicinska antitumoral behandling ges 29 dagar
- [Biverkningar – gradering av toxicitet i samband med behandling med fluorouracil](#)
- [Provtagning, rutinmässig](#)

Dosreduktion hematologi

Substans	Neutrofila	TPK
Vid låga värden diskussion med patientansvarig läkare	< 1,0	<75

Patientinformation

[Patientinformation](#)

[Homepump vid cytostatikainfusion](#)

[Antiemetika, medelemetogen](#)

Körschema

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Kontrollera att patienten tagit antiemetika		
2	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter Mitomycin		Cytodose
3	Ge Mitomycin spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	30 minuter	Cytodose
4	Sätt Fluorouracil i homepump intravenöst	4 dygn	Cytodose

Anmärkningar

Observera 4-dagars homepump infusionen har en noggrannhet på +/- 6-8 timmar