

## Maligt melanom Nivolumab – Relatlimab (Opdualag) 28 d

Cytodose: "Maligt melanom Nivolumab- Relatlimab 28 d"

**Kurlängd: 28 dagar**

**Indikation:** Maligt melanom PDL1<1%

### Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administreringstillfälle, fast dos	Antal administreringstillfällen/dygn	Doser/kur	Adm	Dag
A	Nivolumab - Relatlimab	480 mg /160 mg*	1	1	i.v.	1

	Substans/dag	Dag 1	Paus dag 2-28	Dag 29 ny kur
A	Nivolumab - Relatlimab	A	-	A

\*Läkemedlet innehåller två substanser, nivolumab 480 mg och relatlimab 160 mg. Dosen som visas i cytodosen avser nivolumab.

### Övrigt

- [Biverkningshantering](#)
- [Kontaktuppgifter till konsult](#)
- Apoteket har inte detta i lager, beställ i god tid. För att undvika kassation: apoteket avvaktar beredning trots att preparatet är ordinerat – sjuksköterska ringer när patienten är på plats.
- Preparaten är immunstimulerande. Risken för biverkningar är stor.
- Vid infusionsreaktion som t.ex. feber, frossa eller värk bör Paracetamol 1000 mg och Desloratadin 5 mg ges. Detta kan också övervägas att ges som premedicinering inför behandlingar därefter.
- Patient med TB eller Hepatit-anamnes, kontakta infektion.
- [Immunoterapi kombinerad provtagning](#)

Dosreduceras ej. Avstå från behandlingstillfälle vid toxicitet.

### Patientinformation

#### Körschema

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat

Akutvagn tillgänglig		
Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter varje preparat		
Puls och blodtryck före start		
Ge Nivolumab-Relatlimab spädd i 100 Natriumklorid 9 mg/ml	30 minuter	Cytodos

### Anmärkningar

- Telefonkontakt med patienten till sjuksköterska 1 vecka efter första behandlingen, därefter individuell bedömning.