

GI Panitumumab 14 d

Kurintervall: 14 dagar

Indikation: GI, metastaserad kolorektalcancer KRAS vildtyp

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/kg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Panitumumab	6 mg/kg	1	1	i.v.	1

	Substans/dag	1	Paus dag 2-14	Dag 15 ny cykel/kur
A	Panitumumab	A	-	

Övrigt

- Risk för hypomagnesemi
- Om Panitumumab dos>1000 mg ges infusionen på 90 minuter
- Receptförskrivning av perorala tetracykliner från start
- Att förebygga och behandla hudbiverkningar av EGFR-hämmare
- Provtagning, rutinmässig

Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC -gradering

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4:e gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen
Grad II	Gör uppehåll och återuppta (fulldos) vid tox grad 0-I	Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I	Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I	Avsluta behandlingen
Grad III	Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I	Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I	Avsluta behandlingen	
Grad IV	Avsluta behandlingen			

Dosreduktion hudreaktioner och mjukvävnadstoxicitet

Förekomst av hudsymtom ≥ grad 3 (svårare än eller motsvarande grad 3 definieras som intolerabla, allvarliga eller	Administrering av Panimumab	Utfall	Dosreglering

livshotande)			
Initial förekomst	Hoppa över 1 eller 2 doser och behandla enligt PM	Förbättrat <grad 3	Ge 100 % vid nästa tillfälle
		Inte förbättrat	Avbryt
Vid andra förekomsten	Hoppa över 1 eller 2 doser och behandla enligt PM	Förbättrat <grad 3	Ge 80 % vid nästa tillfälle
		Inte förbättrat	Avbryt
Vid tredje förekomsten	Hoppa över 1 eller 2 doser och behandla enligt PM	Förbättrat <grad 3	Ge 60 % vid nästa tillfälle
		Inte förbättrat	Avbryt
Vid fjärde förekomsten	Avbryt		

Dosreduktion hematologi

Substans	Neutrofila	TPK
Panitumumab	Dosreduceras ej	Dosreduceras ej

Patientinformation

[Patientinformation Panitumumab](#)

Körschema

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1 Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		-
2 Blodtryckskontroll första behandlingen. Risk för överkänslighetsreaktion finns, särskilt vid första infusionen.		
3 Akutvagn tillgänglig		
4 Ge Panitumumab spädd i 100 Natriumklorid 9 mg/ml	1 timme (ges under 30 minuter om tidigare infusioner gått u.a.)	Cytodos