

Bröst Everolimus (Afinitor)

Kurintervall: Kontinuerlig

Indikation

Bröstcancer: I kombination med exemestan, ER+ HER2-

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, fast dos	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Everolimus(Afinitor)	10 mg (fast dos)	1	kontinuerligt	po	Alla

Övrigt

- Dosreduktion bör göras från start. Inled behandling med 5 mg. Elektroniskt recept på 30 tabletter. Telefonuppföljning till läkare efter 1 månad för ställningstagande för dosökning till 10 mg. Ett alternativ är att starta med 10 mg varannan dag
- Startdos vid nedsatt leverfunktion: Child-Pugh A – 7,5 mg, Child-Pugh B – 5 mg, Child-Pugh C max 2,5 mg.
- Prover inför start: Blodstatus + neutrofila, leverstatus, krea, urea, lipidstatus, f-glukos, CRP. Därefter 1 gång per månad. Omkontroll av Blodstatus + neutrofila efter 2 veckor från behandlingsstart.
- Interaktionsbenägen substans, ökad risk för ödem vid samtidig användning av ACE-hämmare.
- Undvik vaccination med levande vaccin under behandlingen (influensavaccin via näsan, gula febern, tyfus) ok att ge vaccin mot influensa och stelkramp.
- Telefonkontakt med sjuksköterska efter 1 vecka (toxkontroll) respektive 2 veckor (kontroll av prover). Lathund: [Everolimus \(Afinitor\) - biverkningar gradering](#)
- Sjuksköterska kontrollerar prover och kontaktar läkare vid avvikande provsvar (rödmarkerat i BoS eller enligt journaltext). Patienten får ingen bekräftelse på proverna så länge de är normala. Vid minsta tveksamhet ska sjuksköterska kontakta läkare; 1. PAL, 2. Cytordinatör, 3. Dagjour.
- Sjuksköterska ska skriva remiss till käkkirurgen inför uppstart av behandling.
- Afinitor fördröjer sårhäkning, varför kontakt med läkare ska tas vid operationer eller tandläkaringrepp.
- Munskölj kortisonlösning 4 gånger per dag kan minska risken för mucositis. Dexametason 0,1 mg/ml (1 mg löses upp i 10 ml vatten). 5 ml gurglas runt i munnen i 2-3 minuter och spottas ut. Behandla från dag 1 i 8 veckor och fortsatt ytterligare 8 veckor om god effekt. Ingen candidaprofylax. Följ kliniskt upp ev. oral candidautveckling och sätt in behandling vid behov. Nasonex kan användas som spray för munhålan i stället för kortisonlösning
- Läkare/ sjuksköterska skriver remiss till vårdcentral för kontroll av blodtryck, initialt varje vecka i 1 månad, sedan utglesning till varannan vecka och därefter individuellt
- Ökad risk för osteoporos. Kontroll av bentäthet vid behov. Behandling av och profylax mot osteoporos startas hos riskpatienter
- [Antiemetika vid behov](#)

Dosreduktion

[Everolimus \(Afinitor\) - biverkningar gradering](#)

- Biverkan grad 1 behövs oftast ingen dosjustering
- Biverkan grad 2-4 :[Dosreduktion vid biverkningar](#) (FASS)

Patientinformation

Patientinformation från regimbiblioteket

- Patientinformation: Broschyr (finns på onkologmottagningen) samt utskriftsvänlig information: [Afinitor-patientinfo](#)
- Vanliga biverkningar är: mukositt, hudutslag, hyperglykemi samt hyperlipidemi.
- Risk för pneumonit som kan kräva kortisonbehandling. Uppmana patienten att höra av sig vid feber, hosta.
- Beakta nutritionssvårigheter pga. oral smärta.

Körschema

	Att göra	Var ordinerat
1	Patienten får recept. Ge patientinformation.	Cosmic