

GI Cisplatin - Gemcitabin 21 d

Kurintervall: 21 dagar

Indikation: Gallväg, pancreas

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Gemcitabin (Gemzar)	1000	1	2	i.v.	1, 8
B	Cisplatin (Platinol)	25	1	2	i.v.	1,8

	Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	Paus dag 9-21	Dag 22 ny cykel
A	Gemcitabin	A	-	-	-	-	-	-	A	-	
B	Cisplatin	B	-	-	-	-	-	-	B	-	

Övrigt

- **Dag 8 skjuts ej upp.** Om man inte kan ge dag 8 hoppar man över och startar ny cykel dag 22
- [Antiemetika: medeleemetogent](#)
- Audiogram.
- Iohexolclearance.
- Provtagning: **Dag -1, samt dag 21.** Blodstatus med neutrofila, krea, kalium, natrium, albumin, korr-Ca, ALP, ALAT, Bilirubin, LD. **Dag 8:** Blodstatus med neutrofila och kreatinin
- [Perifier neuropati - monitorering](#)
- Aminoglykosider skall ej ges under och 1 månad efter cisplatinbehandling.

Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC -gradering

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4:e gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen
Grad II	Återuppta (fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen
Grad III	Återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen	
Grad IV	Avsluta behandlingen			

Dosreduktion hematologi

Substans	Neutrofila	TPK
----------	------------	-----

	< 1,5	<100
Båda preparaten	Behandlingen uppskjutes (eller hoppas över - se ovan)	Behandlingen uppskjutes (eller hoppas över - se ovan) .

Dosreduktion vid nedsatt njurfunktion, head-neck

Substans	GFR 79-70 ml/min	GFR 69-60 ml/min	GFR < 60 ml/min
Cisplatin	100 %	75 %	Cisplatin ersätts med Karboplatin
Gemcitabin	100 %	100 %	100 %

- Försämrad njurfunktion- Om kreatinin ökar >30 % under behandlingen görs nytt lohexolclerance. överväg att seponera Cisplatin.
- Hörselpåverkan- nytt audiogram ska övervägas om hörselpåverkan uppkommer
 - [Patientinformation Cisplatin-gemcitabin](#)
 - [Antiemetika och förebygga influensaliknande symtom](#)
 - [Gemcitabin \(förebygg influensaliknade symtom\) DAG 8](#)

Körschema

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
Prehydrering 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	2 timmar	Cytodos
Kontrollera att patienten tagit antiemetika		Cytodos
Ge Gemcitabin spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion. Ges parallellt med prehydreringen.	30 minuter	Cytodos
Ge Cisplatin spädd i 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion.	1 timme	Cytodos
Posthydrering 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion.	1 timme	Cytodos

Anmärkningar

- Patienten skall uppmanas att dricka rikligt inför behandling, samt efter behandlingsdagen med Cisplatin. Vikt tas behandlingsdag och uppmana patienten att väga sig för att kontrollera att hen inte samlar på sig vätska.