

Vinorelbin - Capecitabin, bröst

Cytodose= "Bröst Vinorelbin-Capecitabin 21 d DAG 1" och "Bröst Vinorelbin-Capecitabin 21 d DAG 8" Kurintervall 21 dagar

Indikation Bröstcancer

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Vinorelbin (Navelbine)	25	1	2	i.v.	1,8
B	Capecitabin	1000	2	21		

	Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Paus dag 15-21	Dag 22 ny kur
A	Vinorelbin	A							A								
B	Capecitabin	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		

Övrigt

- Testa för DPYD-brist innan behandling ges.
- [Antiemetika vid behov](#)
- [Perifer neuropati monitorering](#)
- [Att förebygga och behandla Hand-fotsyndromet](#)
- [Provtagning, rutinmässig](#) Kontroll av blodstatus, leverprover samt telefonkontakt med patienten inför dag 8 i cykel nr 1, därefter vid behov.

Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC-gradering

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4:e gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen
Grad II	Återuppta (fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen
Grad III	Återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen	
Grad IV	Avsluta behandlingen			

[Biverkningar - gradering av toxicitet i samband med behandling med capecitabine](#)

Dosreduktion

Substans	Neutrofila	TPK
	< 1,0	<100
Vinorelbine	Behandlingen skjuts upp	Behandlingen skjuts upp

Capecitabin	Behandlingen skjuts upp	Behandlingen skjuts upp
-------------	-------------------------	-------------------------

Patientinformation

Körschema Vinorelbin-Capecitabin dag 1

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Ge eventuellt antiemetika (om det är ordinerat)		Cytodose
2	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter respektive läkemedel		-
3	Ge Vinorelbin spädd i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	10 min	Cytodose
4	Skriv ut medicinlista från ELAS		-
5	Lämna Capecitabintabletter och medicinlistan till patienten		Cytodose

Körschema Vinorelbin- Capecitabin dag 8

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Ge eventuellt antiemetika (om det är ordinerat)		Cytodose
2	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter respektive läkemedel		-
3	Ge Vinorelbin spädd i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	10 min	Cytodose

Anmärkning

Uppföljning med avseende på hand och fot- syndrom vid varje behandling