

Enureslarm - regler för förskrivning

För vem?

För barn som är mellan 6 och 17 år och har måttligt nedsättning av funktioner för urininkontinens. Enureslarm rekommenderas i första hand förutsatt att familjen är motiverad för detta.

Mål med hjälpmedlet

Bli fri från nattlig enures.

Förskrivare

Sjuksköterska eller uroterapeut på Barn- och ungdomsmottagning (BUMM) eller barnkliniken

Eget ansvar

Familjen står för inköp och kostnad för batterier

Inför förskrivning

Enures utreds med bland annat miktionsanamnes, tarmdagbok och urinstatus för att utesluta bakomliggande orsaker som till exempel diabetes, förstoppning och urinvägsinfektion. Rådgivning om dryckes- och toalettvanor med mera ges. Vid primär enures bör enureslarm vara förstahandsvalet, före läkemedelsbehandling.

Det här är en behandling som kräver aktiv medverkan från föräldrar, särskilt under de första veckorna. En förälder kan behöva sova i barnets rum och hjälpa till att väcka barnet då alarmet ljuder.

Antal

Ett enureslarm och en sensor per barn

Uppföljning

Uppföljning ska ske efter 4 veckor. Vid positivt resultat bör behandlingen fortsätta tills minst 14 torra nätter i rad uppnåts.

ISO-kod