

Uro Olaparib (Lynparca)

Kurintervall: kontinuerlig

Indikation: BRCA-muterad kastrationsresistent metastaserad prostatacancer efter progress på/eller olämplighet för docetaxel och cabazitaxel och enzalutamid/abirateron/darolutamid och Xofigo

	Substans (preparat)	Dos/administrerings- tillfälle, mg	Antal administrerings- tillfällen/dygn	Doser kur	Adm	Dag
A	Olaparib- Lynparca	300	2	28	p.o.	kontinuerligt

	Substans/ dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Dag 29 ny cykel/ kur
A	Olaparib- Lynparca	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

Övrigt

- BRCA-analys görs vid start av Cabazitaxel (för de patienter som antas vara i form för att bli aktuella för ytterligare behandling (ECOG 2) efter progress på Cabazitaxel. Eftergranskningsremiss till patologen skickas på gamla prostatabiopsierna eller om det finns tillgänglig metastasbiopsi (ej skelett)
- Förskrivs på recept från start. Tänk på små förpackningar för att minska risken för svinn vid intolerans.
- Tabletterna (100 och 150 mg) får inte bytas ut mot kapslar (50 mg). Tabletterna tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Glömd dos; nästa dos vid vanlig tidpunkt. Grapefruktjuice och Johannesört ska undvikas.
- Provtagning: Blodstatus+neutrofila, lever, elstatus och kreatinin inför start av behandling och var 4:e vecka. PSA 1 gång/månad. Testosteron inför utvärderingsbesök.
- Interaktionsbenägen substans via CYP3A systemet bland annat, var god se FASS. Försiktighet med statiner rekommenderas

Dosreduktion ???

		Gör uppehåll tills nivåerna återgår till	Återuppta behandling
Hb	< 80	≥90	med lägre dos
TPK	< 50	≥75	med lägre dos
Neutrofila	< 1,0	≥ 1,5	med lägre dos
Icke - hematologiska	grad	grad 1	Överväg att återuppta behandling med

biverkningar	3-4	minskad dos eller sätt ut
--------------	-----	---------------------------

[Patientinformation](#)**Körschema**

Patienten får recept

Tabletterna tas med eller utan mat. Om patienten kräks eller missat en tablett ska ingen extra dos tas den dagen. Nästa ordinerade dos tas vid den vanliga tiden.

Grapefruktjuice och Johannesört ska undvikas