

GI Cetuximab iv-Encorafenib po 28 d

Kurintervall 28 dagar

Cytodos: "GI Cetuximab LADDNINGSDOS", "GI Cetuximab UNDERHÅLLSDOS"

Indikation: Generaliserad colorektal cancer med mutation i BRAF V600E, NRAS/KRAS wildtype
som tidigare har fått systemisk behandling

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings- tillfälle mg/m ²	Antal administrerings- tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Cetuximab	400 mg/m ² (Laddningsdos, endast kur 1:1) 250 mg/m ² (Underhållsdos from andra behandlingen)	1	1	i.v.	1
B	Encorafenib	300 mg standarddos	1	28	p.o.	1- 28

Substans/d ag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Da g 29 ny kur
A Cetuximab	A	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	A
B Encorafenib	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

Övrigt

- Apoteket har inte Cetuximab i lager. Faxe beställning i god tid.
- EKG rekommenderas innan encorafenib sätts in, 1 månad efter behandlingsstart och därefter med ca 3-månaders intervall eller oftare om kliniskt indicerat, så länge behandlingen pågår. Värdera QTc-tid. QTc-förlängning över 500 ms är kontraindicerat (se FASS) – kontakt kardiolog.
- Efterfråga ögonsjukdom och/eller återkommande ögon/synproblem. Eventuell ögonundersökning innan start.
- Encorafenib skrivs på recept. Lagerförs inte på apotek utan behöver beställas vid varje recept. Inför kur 1 är det inte tvunget att starta Encorafenib samma dag som Cetuximab om apoteket inte hinner få hem tabletterna i tid.

- Hudbiverkningar och dosreduktion för cetuximab - se Erbitux broschyr samt:
[Att förebygga och behandla hudbiverkningar av EGFR-hämmare.](#)
- Profylatisk behandling med mjukgörande, hydrokortison 1 % samt tetralysal eller doxyferm.
- Cetuximab dosreduceras inte.
- Behandlingen avbryts permanent vid överkänslighetsreaktion grad 3 eller 4.
- Behandlingen pausas vid annan biverkan av grad 3 eller 4, förutom mukositis eller hudbiverkan.
Behandlingen kan i sådana fall återupptas efter individuell bedömning.
- Provtagning: Inför behandlingsstart:** Blodstatus med neutrofila, leverstatus, njurstatus, troponin.
Under behandling inför dag 1 och 15: Blodstatus med neutrofila, njurstatus, leverstatus, magnesium, troponin var 4:e vecka. (Inför dag 8 och 22- ingen provtagning.)
- [Antiemetika vid behov](#)
 - [Patientinformation](#)
 - [Allergiprofylax](#)
 - [Hudbiverkningar vid EGFR- hämmare](#)

Körschema: Cetuximab LADDNINGSDOS, endast kur 1:1

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1 Akutvagn tillgänglig		
2 Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		-
3 Kontrollera att patienten tagit allergiprofylax		Cytodos
4 Puls och blodtryckskontroll före start. Vid första och andra behandlingen ska patienten övervakas med avseende på överkänslighetsreaktioner		
5 Ge Cetuximab spädd i 500 Natriumklorid 9 mg/ml	2 timmar för första dosen	Cytodos
6 Patienten ska kvarstanna för observation 1 timme efter avslutad behandling (vid första behandlingstillfället)		
7 Se till att patienten startar behandling med Encorafenib. Tas en gång om dagen, förslagsvis till kvällen med eller utan mat. 24 h timmar mellan doserna. Glömd kapsel kan tas om det inte gått mer än 12 timmar, annars ska den hoppas över		Cosmic

Körschema: Cetuximab UNDERHÅLLSDOS

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1 Akutvagn tillgänglig		
2 Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		-

3	Kontrollera att patienten har tagit ordinerad profylax mot allergiska reaktioner		Cytodos
4	Puls och blodtryckskontroll före start. Vid första och andra behandlingen ska patienten övervakas med avseende på överkänslighetsreaktioner		
5	Ge Cetuximab spädd i 500 Natriumklorid 9 mg/ml	1 timme	Cytodos

Anmärkningar

- Samtidigt intag av grapefruktjuice och johannesört ska undvikas