

Bröst Trastuzumab – Paclitaxel 21d palliativ

Kurintervall: 21 dagar

Cytodose: "Bröst Trastuzumab LADDNINGSDOS"/UNDERHÅLLSDOS" + "Bröst Paclitaxel dos 1+2/reaktion"/UNDERHÅLL"

Indikation

Bröstcancer HER2 positiv. Palliativ behandling.

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Paclitaxel	80 mg/m ²	1	2	i.v.	1, 8
B	Trastuzumab	8 mg/kg (1:a dos) 6 mg/kg (övriga doser)	1	1	i.v.	1

	Substans/dag	1	8	Paus dag 9 -21	Dag 22 ny kur
A	Paclitaxel	A	A	-	
B	Trastuzumab	B	-	-	

Övrig

- I regimen "Bröst Paclitaxel dos 1+2 samt om patienten reagerat" är infusionstiden default satt till 2 timmar. Ändra manuellt i Cytodose till 1 timme om det är dos 1 eller 2 som ordineras förutsatt att patienten inte reagerar.
- [Antiemetika](#)
- UKG tas innan behandlingsstart och var 3:e månad under trastuzumab-behandlingen. Datum för första UKG samt baseline/utgångs EF (ejektionsfraktion) skall dokumenteras i canceröversikten under rubriken "undersökningresultat till onkologisk översikt" av den läkare som signerar svaret.
- Om planerad trastuzumabinfusion blir uppskjuten mer än 1 vecka krävs ny laddningsdos
- Allergiprofylax: Vid trastuzumab-reaktion ordinaera premedicinering: T. Desloratadin 5 mg, T. Paracetamol 1 g, 1-3 timmar före start.
- [Kontroll av perifer neuropati](#)
- [Provtagning](#)

Dosreduktion

Substans	Neutrofila	TPK
	<1,5	<100
Paclitaxel	Behandlingen uppskjutes	Behandlingen uppskjutes

- Trastuzumab dosreduceras ej.

Patientinformation

[Trastuzumab](#)

[Paclitaxel](#)

[Allergiprofilax inför paclitaxel](#)

Körschema dag 1 (dos 1+2 samt om patienten har reagerat)

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
Akutvagn tillgänglig		-
Blodtryckskontroll innan behandlingsstart av Trastuzumab de 2 första behandlingarna av Trastuzumab		
Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter respektive läkemedel		
Ge Trastuzumab spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	90 minuter (1:a gången) därefter 30 minuter	Cytodos
OBS! Premedicinering med Betapred enligt nedan ges endast de två första Paclitaxelbehandlingarna samt vid reaktion. Därefter ges endast Desloratadin enligt nedan		
Ge T. Betapred 8 mg 1-3 innan paclitaxel Ge T. Desloratadin 5 mg 2 tabletter 1-3 timmar innan paclitaxel		
Paclitaxel: Vid dos 1 och 2 kontrollera blodtryck före start och obs av patienten 15 minuter. Om patienten har reagerat, ta blodtryck inför varje start. Inga rutinmässiga blodtryckskontroller vid underhållsdos.		
Ge Paclitaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	1 timme (2 timmar om patienten reagerat) (1 timme dos 1+2)	

Körschema dag 8, 15

Att göra	Inf tid	Var ordinerat
Vid kur 1 dag 8 samt vid reaktion på Paclitaxel ges premedicinering enligt körschema dag 1		
Akutvagn tillgänglig		-
Kontrollera att patienten tagit allergiprofylax T. Desloratadin 5 mg 2 tabletter 1 -3 timmar innan paclitaxel		
Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter Vid dos 1 och 2 kontrollera blodtryck före start och obs av patienten 15 minuter. Om patienten har reagerat, ta blodtryck inför varje start. Inga rutinmässiga blodtryckskontroller vid underhållsdos.		Cytodos
Ge Paclitaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	1 timme	Cytodos