

Malignt melanom Dabrafenib (Tafinlar)

Cytodose= ej ännu aktuellt Kurintervall: kontinuerlig

Indikation

Malignt melanom. Metastaserat eller ickeoperabelt V600 BRAF-muterat malignt melanom

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings- tillfälle, fast dos	Antal administrerings- tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Dabrafenib(Tafinlar)	2x75 mg(150 mg)	2*	kontinuerligt	po	Alla

* Tas med ca 12 timmars mellanrum 1 timme före eller 2 timmar efter måltid

Övrigt

- Mutation i BRAF V600 krävs innan start
- Kontinuerlig tablettbehandling. Tablett delas ut från mottagningen första veckan. Därefter skriv recept, för en månad i taget (uttagsintervall 1 vecka). Extra dyr behandling. Apoteket har inte detta i lager.
- Stor risk för interaktion med andra läkemedel - genomgång av läkemedelslista vid insättning

Kontroller inför start

- Klinisk status med undersökning av hud och slemhinnor inkl. anus
- EKG
- Prover: Blodstatus (inkl neutrofiler), bilirubin och LD, ASAT, ALAT, ALP, gamma-GT, urea, p-glukos, Na, K, Mg, krea
- Radiologisk staging innan start
- Fertila kvinnor, graviditetstest före behandlingsstart. Antikonception

Kontroller under behandling

- Hudstatus var tredje månad, upp till 6 månader efter behandling
- EKG månadsvis i 3 månader, därefter EKG var 3 månad
- Prover **veckovis** (första månaden, därefter 1 ggr/ månad): Urat, kreatinin och fosfat **Månadsvis**: Blodstatus (inkl neutrofiler), bilirubin och LD, ASAT, ALAT, ALP, gamma-GT, urea, p-glukos, Na, K, Mg, krea.
- Interaktionsbenägen substans. Påverkar CYP 3A4. Bl a följande enzyminducerande substanser sänker effekten av dabrafenib: Karbamazepin, Rifampicin, Fenytoin, Johannesört. Enzymhämmare Konazoler. Undvik om möjligt protonpumpshämmare (reducerar dabrafenibs biotillgänglighet. Kan minska effekten av systemiska hormonella preventivmedel.
- Särskild toxicitet att beakta: Pyrexia, kutan skivepitelcancer, QT-tidsförlängning, uveit

Dosreduktion

- Dosreduktion vid biverkningar - [FASS](#)
- Biverkningsrapportering - [FASS](#)
- [Patientinformation](#)
- Patienten skall vara muntligt och skriftligt informerad. Patienten skall kontakta onkologkliniken vid nytillkomna symtom

Körschema: Dabrafenib

	Att göra	Var ordinerat
1	Ge tabletter för första veckan samt patientinformation	Cosmic