

GI Karboplatin AUC 5 – Paclitaxel 80 mg dag 1,8,15 28 d

Cytodose: Dag 1 "GI Karboplatin AUC5-Paclitaxel 80 mg 28 d" Dag 8 + 15:
"GI Paclitaxel dos 1+2 samt om reaktion" / "GI Paclitaxel UNDERHÅLL"

Kurintervall 28 dagar

Indikation: Analcancer palliativ, neoadjuvant

	Substans (preparat)	Dos/administrerings- tillfälle mg/m ²	Antal administrerings- tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Paclitaxel	80	1	3	i.v.	1, 8, 15
B	Karboplatin	AUC 5*	1	1	i.v.	1

*Calverts formel Dos (mg) = (planerad AUC) x (GFR ml/min + 25)

	Substans/dag	1	8	15	Paus 16-28	Ny kur dag 29
A	Paclitaxel	A	A	A	-	A
B	Karboplatin	B	-	-	-	B

Övrigt

- Maxdos Karboplatin AUC 5 750 mg
- Iohexolclearance används för uträkning av absolut = okorrigerat GFR.
Använd det okorrigerade värdet för dosering av karboplatin
- Om krea stiger > 30 % från baselineundersökning inför behandlingsstart bör nytt Iohexolclearance övervägas.
- Dag 1 och 8 samt vid reaktion ordineras före start av Paclitaxel:
Betametason 8 mg po, T. Desloratadin 5 mg 2 tabletter.
- Premedicinering Paclitaxel från och med tredje behandlingen om ej tidigare reaktion har inträffat: T. Desloratadin 5 mg 2 tabletter 1 -3 timmar innan start av infusion Paclitaxel.
- [Antiemetika, högemetogen](#)

Dosreduktion hematologi

Substans	Neutrofila	TPK
	< 1,5	<100

Karboplatin	Behandlingen uppskjutes en vecka	Behandlingen uppskjutes en vecka
Paclitaxel	Behandlingen uppskjutes en vecka	Behandlingen uppskjutes en vecka

Patientinformation

[Patientinformation Karboplatin – Paklitaxel](#)

[Antiemetika- och allergischema dag 1](#)

[Allergischema dag 8 + 15](#)

Körschema dag 1

	Att göra	Inf tid	Var ordinerat
1	Akutvagn tillgänglig		-
2	Sätt spoldropp 500 ml Natriumklorid för spolning före och efter respektive läkemedel		
3	Ge eller kontrollera att patienten tagit allergiprofylax Ge T. Desloratadin 5 mg 2 tabletter 1 timme innan paclitaxel Ge T. Betapred 8 mg 1 timme innan paclitaxel		Cytodose
4	Kontrollera blodtryck före start av Paclitaxel dag 1 och 8 samt om patienten reagerat. OBS av patienten de första 15 min av Paclitaxel dag 1 och 8 kur 1.		
5	Ge Paclitaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion.	1 timme (2 timmar om reaktion)	Cytodose
6	Kontrollera att patienten tagit antiemetika.		Cytodose
7	Ge Karboplatin spädd i 500 ml Glukos 50 mg/ml som intravenös infusion	30 min	Cytodose

Körschema dag 8 + 15

	Att göra	Inf tid	Var ordinerat
1	Akutvagn tillgänglig		-
2	Kontrollera att patienten har tagit 2 tabletter Desloratadin 5 mg, 1-3 timmar före start av Paclitaxel., Betapred 8 mg – endast första och andra Paclitaxelbehandlingen och om patienten reagerat		Cytodose
3	Kontrollera blodtryck före start av Paclitaxel dag 1 och 8 samt om patienten reagerat. OBS av patienten de första 15 min av Paclitaxel dag 1 och 8 kur 1		

4	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter respektive läkemedel		Cytodose
5	Ge Paclitaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	1 timme (2 timmar om reaktion)	Cytodose