

GI SIRI (Teysono-Irinotekan) 21 d

Kurintervall: 21 dagar

Indikation: Tjock- och ändtarmscancer

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Irinotekan	225	1 (endast dag 1)	1	i.v.	1
B	S1 (Teysono)	25	2*	28	p.o.	1-14*

	Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14*	Paus dag 15*-21	Dag 22 ny cykel/kur
A	Irinotekan	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	S1 (Teysono)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	

Övrigt

- Antiemetika medelemetogen
- Irinotekan - premedicinering: ge subkutan Atropin 0,25 mg för att förebygga akut kolinerget syndrom. Om symtom uppstår, ge ytterligare subkutan Atropin 0,25-0,50 mg.
- Var särskilt observant vid diarréer och feber. Kan kräva inläggning.
- Provtagning, rutinmässig

Patientinformation

Antiemetikaschema: delemetogen

Patientinformation SIRI

Körschema

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1.	Kontrollera att patienten tagit antiemetika		Cytodose
2.	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid		-
3.	Ge subcutan injektion Atropin (ca 30 minuter före Irinotekan)		Cytodose
4.	Ge Irinotekan spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som	30 minuter	Cytodose

	intravenös infusion		
5.	Skriv ut medicinlista från ELAS		Cytodose
6.	Lämna kapslar Teysuno och medicinlistan till patienten		Cytodose

Anmärkningar

Telefonkontakt med kontakt med sjuksköterska dag 8 i kur 1