

## Bröst EC 90 (Epirubicin/Cyklofosfamid) dos-dens 14 dagar

Cytodos: "Bröst EC 90 dos-dense 14 d" Kurintervall: 14 dagar

Indikation: adjuvant, neoadjuvant (4 kurer)

### Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle m <sup>2</sup>	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/kur	Adm	Dag
A	Epirubicin	90	1	1	i.v.	1
B	Cyklofosfamid	600	1	1	i.v.	1
C	Pegfilgrastim	6 mg	1	1	s.c.	2

	Substans/dag	1	Paus dag 2-14	Dag 15 ny kur
A	Epirubicin	A		
B	Cyklofosfamid	B		

### Övrigt

- Inför adjuvant antracyclinbehandling ska en kardiovaskulär riskbedömning göras, se lokala riktlinjer bröstcancer.
- G- CSF ingår i regimen. Ordineras i Cosmic. Delas ut av sjuksköterska, ej på recept.
- Ackumulerad dos epirubicin=max 900mg/m<sup>2</sup>
- Dosreduktion vid nedsatt leverfunktion
- 3 veckor mellan EC och taxan
- [Antiemetika högemetogent](#) (Akynteo delas ut av sjuksköterska, ej på recept)
- [Bedömning av antiemetikabehov](#)
- [Provtagning, rutinmässig](#)

### Dosreduktion

Substans	Neutrofila	Neutrofila	TPK	TPK
	≥ 1,0	< 1,0	≥ 100	<100
Epirubicin	100 %	Behandlingen uppskjutes	100 %	Behandlingen uppskjutes
Cyklofosfamid	100 %	Behandlingen uppskjutes	100 %	Behandlingen uppskjutes

Förslag på dosreduktion [NRB](#)

- [Patientinformation](#) Obs! stryk Filgrastim – vi ger pegfilgrasim 1 dos
- [Högemetogent](#)

**Körschema**

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Kontrollera att patienten tagit antiemetika		
2	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter respektive läkemedel		-
3	Ge Epirubicin spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	30 minuter	Cytodos
4	Ge Cyklofosamid spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	20 minuter	Cytodos
5	Lämna ut pegfilgrastim 1 spruta Om inte pegfilgrastim är ordinerat, påminn läkare att ordinera detta i Cosmic		Cosmic