

Uro Vinflunin 21 d

Cytodose= Uro Vinflunin 21 d

Kurintervall: 21 dagar

Indikation

Avancerad eller metastaserande övergångsepitelcancer i urotelet efter behandlingssvikt med platinum-innehållande behandling.

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Vinflunin (Javlor)	320*	1	1	i.v.	1

* Startdosen förutsätter PS=0, och att ingen strålbehandling givits av bäckenet.

	Substans/dag	1	2-21	Dag 22 ny kur
A	Vinflunin	A	-	

Övrigt

- [Antiemetika lågemetogen](#)
- Nedsatt lever/njurfunktion kräver dosanpassning. Se FASS.
- Ordinera Cilaxoral och/eller Forlax förebyggande. Svår förstoppning kan föranleda behov av dosreduktion.
- [Provtagning](#)

Dosreduktion

Substans	Neutrofila	Neutrofila	TPK	TPK
	≥ 1,0	< 1,0	≥100	<100
Vinflunin	100 %	Behandlingen utgår	100 %	Behandlingen utgår

[Patientinformation Vinflunin](#)

Körschema Vinflunin

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Sätt spoldropp Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml		-
2	Ge Vinflunin spädd i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	20 min	Cytodose