

Medelemetogen + allergi (Oxaliplatin)

Dag 1

- T. Betametason 8 mg po 1 tim före behandling (alternativt Betametason 8 mg i.v.)
- T. Ondansetron 16 mg po (alternativt Ondansetron 8 mg iv) 1 tim före behandling
- T. Paracetamol 1 g po 1 tim före behandling
- T. Desloratadin 10 mg po 1 tim före behandling
- T. Olanzapin 2,5 mg t.n

Dag 2

- T. Ondansetron 8 mg po
- T. Olanzapin 2,5 mg t.n

Patienter med ökad risk för illamående/ vid otillräcklig effekt

Dag 1

- T. Aprepitant (Emend) 125 mg
- T. Betametason 8 mg po 1 tim före behandling (alternativt Betametason 8 mg i.v.)
- T. Ondansetron 16 mg po (alternativt Ondansetron 8 mg iv) 1 tim före behandling
- T. Paracetamol 1 g po 1 tim före behandling
- T. Desloratadin 10 mg po 1 tim före behandling
- T. Olanzapin 2,5 mg t.n.

Dag 2

- T. Aprepitant (Emend) 80 mg
- T. Ondansetron 8 mg po
- T. Olanzapin 2,5 mg t.n

Dag 3

- T. Aprepitant (Emend) 80 mg

Vid behov

T. Olanzapin 2,5 mg – 5 mg (max 10 mg/dygn) rekommenderas till natten fler än 2 dagar

Alternativ till olanzapin är metoklopramid (primperan) som kan ges vid motilitetsrelaterat illamående eller till patienter som blir mycket trötta av olanzapin.

Undvik kombination med olanzapin och metoklopramid

**Aprepitant och Ondansetron kan ge förstoppning.
Ordinera Cilaxoraldroppar vid behov.**