

## Lung Pemetrexed 21 d

Kurintervall: 21 dagar

**Indikation: Lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer. Second linebehandling. Underhållsbehandling efter första linjens behandling.**

### Behandling

Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle mg/m <sup>2</sup>	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A Pemetrexed (Alimta)	500	1	1	i.v.	1

Substans/dag	1	Paus dag 2-21	Dag 22, ny cykel
A Pemetrexed	A -		

### Övrigt

- [Antiemetika lågemetogen](#) Ordinera tablett Betapred 8 st morgon och kväll (dagen före, behandlingsdagen samt dagen efter), dvs. 4 mg x2. Syftet är att minimera hudreaktioner.
- Uppmana patienten att avsluta eventuell behandling med NSAID (minst 5 dagar innan behandlingsstart). Återinsätt först 2 dygn efter given cytostatika.
- Ordinera tablett Folacin 1 mg 1 tablett dagligen. Starta en vecka före behandlingsstart och avsluta tre veckor efter sista dosen av pemetrexed.
- Ordinera Hydroxocobalamin s.c 1 mg/ml, 1 ml var 9:e vecka (ok att ge mellan 7-10 veckor) med start minst 7 dagar före pemetrexed. Avsluta behandlingen tidigast 3 veckor efter sista dosen pemetrexed, d.v.s. ge sista Hydroxocobalamininjektionen tidigast 6 veckor före sista behandlingen.
- Antal cykler: 4 st
- [Provtagning](#)

### Dosreduktion hematologi

Substans	Neutrofila	TPK	Bilirubin	ALP, ASAT, ALAT
	<1,5	<100	>1,5 x övre gräns för	>3 x övre gräns
Pemetrexed	Behandlingen skjuts upp en vecka.	Behandlingen skjuts upp en vecka.	Behandlingen skjuts upp en vecka.	Behandlingen skjuts upp en vecka.

### Patientinformation

[Patientinformation Pemetrexed](#)

[Betapredschema för att förebygga hudbiverkningar](#)

### Körschema

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		
2	Kontrollera att patienten tagit tablett Betapred enligt instruktion		
3	Ge Pemetrexed spädd i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml intravenöst	15 minuter	Cytodos