

Infektionsscreening under graviditet

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om infektionsscreening av gravida (SOSFS 2004:13) gäller följande:

Hepatit B, HIV samt syfilis.

Alla gravida kvinnor skall i tidig graviditet erbjudas provtagning för hepatit B, HIV samt syfilis.

Hepatit C

Provtagning

Provtagning för Hepatit C tas hos kvinnor med tidigare eller aktuellt intravenöst missbruk eller med missbrukande partner.

Övriga riskgrupper för Hepatit C är följande:

- Personer som söker vård med alkohol eller substansrelaterad problematik (inklusive intoxicationer)
- Personer som piercat/tatuerat sig under icke sterila förhållanden
- Migranter från länder där HCV-infektion är vanligt (se smittskydd Stockholms lista)*
- Personer som är eller varit intagna inom kriminalvården
- Personer som säljer sex mot ersättning
- Personer med förhöjda transaminaser (ASAT; ALAT) samt personer med gulsot, leverfibros/cirros, levercancer
- Personer som fått blodprodukter före 1992 i Sverige och övriga Västeuropa,
- Nordamerika, Japan, Nya Zeeland, Australien. För övriga länder alla som fått blodprodukter oavsett tidpunkt.
- Sexpartners till personer med HCV
- Mödrar till barn med HCV-infektion
- Personer med HBV-infektion eller hiv
- Personer som önskar testa sig utan angiven orsak

*<https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/hepatit/lander-med-hog-forekomst-av-hepatit-c.pdf>

Rubella

Rubellaantikroppar kontrolleras på alla kvinnor - oavsett nationalitet - som genomgår sin första graviditet inom svensk mödravård.

Vid nästa graviditet skall immuniteten inte kontrolleras. Det finns kvinnor som aldrig når mätbara antikroppar trots upprepade vaccinationer. Om det trots det står

”ej ua” under rubellaprov informeras kvinnan om att upprepade vaccinationer saknar effekt”.

Klamydia

Klamydiaprov erbjuds till alla.