

Bröst CM Cyklofosamid- Metotrexate p.o. 28 d

Cytodos: "Bröst Cyklofosamid-Metotrexat po" Kurintervall 28 dagar

Indikation: Bröst, palliativ

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/kur	Adm	Dag
A	Cyklofosamid	50 mg standarddos	1	28	p.o	
B	Metotrexate	2,5 mg standarddos	2	16	p.o.	

Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
A Cyklofosamid	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
B Metotrexate	x 2	x 2					x 2		x 2					x 2	x 2						x 2	x 2							

Övrigt

- [Antiemetika vid behov](#)
- Observanda pleuravätska och ascites
- Nedsatt njurfunktion (S-kreatinin > 120 mikromol/L) pleuravätska och ascites är kontraindikation för Metotrexat.
- [Provtagning, rutinmässig.](#)
- Efterfråga symtom på cystit

Dosreduktion hematologi

LPK	TPK	Metotrexate	Cyklofosamid
< 3,0	< 100	50 %	50 %
< 2,0	< 75	Gör uppehåll i behandlingen	Gör uppehåll i behandlingen

Patientinformation

Körschema

1.	Skriv ut medicinlista från ELAS	
2.	Lämna tabletter och medicinlistan till patienten. Dosering i förhållande till måltid: Tas minst en timme före eller två timmar efter måltid	Cytodose

Anmärkningar

Provtagning med blodstatus och telefonkontakt med patienten dag 8 i cykel nr 1, därefter vid behov.