

GI Nivolumab s.c. 1200 mg 28 d

Cytodos: "GI Nivolumab s.c. 1200 mg 28 d"

Kurlängd: 28 dagar

Indikation

Ventrikel och esofaguscancer + kolorektal MSI high underhållsbehandling efter 4 kurer Ipilimumab-Nivolumab.

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings- tillfälle, mg	Antal administrerings- tillfällen/dygn	Doser/kur	Adm	Dag
A	Nivolumab	1200 mg (fast dos)	1	1	s.c.	1

	Substans/dag	1	Paus dag 2-28	Dag 29 ny cykel
A	Nivolumab	A	-	

Behandlingen pågår tills patienten progredierar eller får biverkningar som kräver utsättning

Övrigt

- [Biverkningshantering](#) och [Kontaktuppgifter till konsult](#)
- Vid byte från 600 mg varannan vecka till 1200 mg var fjärde vecka ska den första dosen på 1200 mg ges två veckor efter den sista dosen på 600 mg
- Vid byte från 1200 mg var fjärde vecka till 600 mg varannan vecka ska den första dosen på 600 mg ges fyra veckor efter sista dosen på 1200 mg
- Vid infusionsreaktion som t.ex. feber, frossa eller värk bör Paracetamol 1000 mg och Desloratadin 5 mg ges. Detta kan också övervägas att ges som premedicinering inför behandlingar därefter.
- Patient med TB eller Hepatit-anamnes, kontakta infektion
- [Provtagning immunoterapi singel](#)
- *Dosreduceras ej. Uppehåll eller behandlingsavslut vid toxicitet.*
- Antikonception

Patientinformation

Körschema

Att göra	Administreringstid	Var ordinerat
Akutvagn tillgänglig		-
Låt 2 injektionsflaskor med Nivolumab 600 mg vardera uppnå rumstemperatur och dra därefter upp 10 ml injektionsvätska i sprutan		
Ge subkutan Nivolumab i magen eller låret, med fördel via butterflykanyl. Hela dosen ges på samma ställe. Byt injektionsställe vid efterföljande injektioner. Injicera inte i områden där huden är öm, röd, har blåmärken, ärr eller leverfläckar.	3-5 minuter	Cytodos
Patienten ska stanna kvar 15 minuter efter behandlingen för observation		

Anmärkningar

Telefonkontakt med patienten till sjuksköterska 1 vecka efter första behandlingen, därefter individuell bedömning. Kontroll av immunorelaterade biverkningar.