

Urologi

- Urinvägsöversikt
- Urografi – avflöde
- Antegrad och retrograd pyelografi

Kontraindikationer

Om graviditet föreligger ska undersökning övervägas.

Vid intravenös kontrast, se separat dokument.

- Intravaskulär jodkontrast vid röntgenundersökning. Information till remitterande enheter.

Alla smycken och kläder som finns i undersökningsområdet ska tas av. Om patienten inte kan vara stilla på grund av smärta måste premedicinering ges. Urinvägsöversikt kräver inga ytterligare förberedelser.

För urografi gäller följande:

- Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
 - Tolkbehov inför röntgenundersökning.
- Aktuellt S/Kreatinin (elektiva patienter inte äldre värde än 3 månader, akuta/inneliggande patienter inte äldre värde än 24 timmar) samt längd och vikt ska finnas i Cosmic.
- Frågeformuläret: "Frågor att besvara inför röntgenundersökning med jodkontrastmedel" ska vara ifyllt och medfölja patienten till röntgen, se separat frågeformulär.

För retrograd pyelografi krävs en uretärkateter satt av urolog.

För antegrad pyelografi krävs en befintlig nefrostomikateter.

Hur går en undersökning till

Urinvägsöversikt: Vi tar bilder över urinvägarna. Tidsåtgång 5 – 10 minuter.

Urografi: Vi sätter en PVK. Bilderna tas liggande och antal bilder beror på frågeställning. Tiden varierar från 5 minuter till 30 minuter.

Antegrad/Retrograd pyelografi: Vi sprutar kontrast i befintlig kateter och tar bilder på förloppet.

Remiss

Vid retrograd pyelografi ska det anges **tydligt** på remissen om katetern ska lämnas orörd eller avlägsnas efter undersökningen.

Eftervård

Utan intravenös kontrast: Ingen eftervård.

Med intravenös kontrast, se separat dokument.

- Att tänka på efter röntgenundersökning efter intravaskulära kontrastmedel.