

Bröst Olaparib (Lynparza)

Kurlängd: kontinuerlig

Indikation: HER2-negativ bröstcancer. Bekräftad germline-mutation i BRCA1/2 och HER2-negativ bröstcancer

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser kur	Adm	Dag
A	Olaparib-Lynparza	300	2	28	p.o.	kontinuerligt

	Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Dag 29 ny cykel/kur
Olaparib	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

Övrigt

- Obs! Olaparib (Lynparza) tabletter (100 och 150 mg) får INTE bytas ut mot Lynparza kapslar (50 mg) pga skillnader i dosering och biotillgänglighet för respektive formulering
- Behandling får starta tidigast 2 veckor efter avslutad strålbehandling och pågår i ett år.
- Förskrivs på recept från start. Tänk på små förpackningar för att minska risken för svinn vid intolerans.
- Provtagning: Blodstatus + neutrofila, lever, elstatus och kreatinin inför start av behandling och inför varje ny kur (var 4:e vecka).
- Interaktionsbenägen substans via CYP3A systemet bland annat, var god se FASS. Försiktighet med statiner rekommenderas
- [FASS](#)

Dosreduktion

Dossänkning för att hantera biverkningar kan ske i två steg till 250 mg x 2 och vidare 200 mg x2

GI-toxicitet: Vid uttalat illamående; behandlingsuppehåll till symtomfrihet, därefter återinsättande av preparatet i oförändrad dos.

		Gör uppehåll tills nivåerna återgår till	Återuppta behandling
Hb	< 80	≥90	med lägre dos
TPK	< 50	≥75	med lägre dos
Neutrofila	< 1,0	≥ 1,5	med lägre dos
Icke - hematologiska biverkningar	grad 3-4	grad 1	Överväg att återuppta behandling med minskad dos eller sätt ut

Patientinformation**Körschema**

Patienten får recept

Tabletterna tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Glömd dos; nästa dos vid vanlig tidpunkt. Grapefruktjuice och Johannesört ska undvikas.