

CT Huvud, ansikte, hals och torax, instruktion, röntgen Region Jönköpings län

Kontraindikationer

Vid intravenös kontrast, se dokument "Intravaskulär jodkontrast vid röntgenundersökning. Information till remitterande enheter".

Förberedelser

- Ange eventuellt tolkbehov, se dokument "Tolkbehov inför röntgenundersökning".
- Alla smycken och kläder (med metall detaljer) som finns i undersökningsområdet ska vara bortplockat

Vid intravenös kontrast

- Patienten ska vara välhydrerad.
- Aktuellt S/Kreatinin (elektiva patienter inte äldre värde än 3 månader, akuta/inneliggande patienter inte äldre värde än 24 timmar) samt längd och vikt ska finnas i Cosmic.
- Ifyllt och undertecknat frågeformulär ska medfölja patienten till röntgen, se separat frågeformulär "Frågor att besvara inför röntgenundersökning med jodkontrastmedel".
- Väl fungerande PVK (inte handrygg), storlek enligt information från röntgen, godkänd venport (surecan Safety venportsnål 19G) eller piccline ("Power PICC SOLO" 5 ml/s Max) ska finnas.

Om patienten inte kan ligga still på grund av oro eller smärta måste han/hon ha någon form av premedicinering.

Hur går en undersökning till

Patienten ska kunna ligga stilla under bildtagningen (cirka 30 sekunder/scan) och undersöks i ryggläge

Eftervård

- Utan intravenös kontrast: Ingen eftervård
- Med intravenös kontrast, se dokument "Att tänka på efter röntgenundersökningar efter intravaskulära kontrastmedel".