

Tillägg till rutiner gällande Angioenheten för diabetiker som ska opereras

Gäller angioenheten Ryhov, och endast vakna patienter i samband med angiografi.

- Vid rapportering från avdelningen ska information om att det är en diabetiker finnas (inklusive om det är en typ 1 eller typ 2 diabetiker).
- Patienterna har Glukos 50 mg/mL med elektrolyter (med pump, gäller patienter som är insulinbehandlade) eller Ringer-Acetat (tablettbehandlade patienter) pågående när de kommer. Kärlkirurger har ordinerat vb mall med insulin lispro för samtliga berörda patienter (typ 1 och typ 2 diabetiker). Om det för en typ 1 diabetiker finnas en patientspecifik ordination som avviker så ska det framgå skriftligt i Cosmic och detta bör muntligen rapporteras från avdelningspersonalen till personalen på angiolabb.
- P-glukos tas kapillärt (eller venöst/arteriellt) 1 gång i timmen. Om det visar sig finnas behov av att ge insulin vid mer än 2 tillfällen kan narkosläkare (telefon 29282)/PAL kontaktas för konsultation innan en tredje dos ges. Detta eftersom effekten av subcutant given dos sitter i längre än 1 timme.
- Mån-fre dagtid går det också bra att ringa till specialistsjuksköterska Maria Dillström 21325 för allmänna och/eller patientspecifika diskussioner. Om hon inte svarar – försök med 21380 (samordnaren).

Om dokumentet

Riktlinjerna är framtagna inom Region Jönköpings län av verksamhetsrepresentanter för Angioenheten Ryhov.