

## Maligt melanom Pembrolizumab 2 mg/kg 21 d

Cytodose= "Maligt melanom Pembrolizumab 2 mg/kg 21 d" **Kurlängd 21 dagar**

**Indikation:** Maligt melanom som andrahands behandling när Nivolumab inte är aktuellt.

### Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/kg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Pembrolizumab	2 (maxdos 200 mg)	1	1	i.v.	1

	Substans/dag	1	Paus dag 2-21	Dag 22 ny cykel
A	Pembrolizumab	A	-	

Behandlingen pågår tills patienten progredierar eller får biverkningar som kräver utsättning

### Övrigt.

- [Biverkningshantering via kunskapsbanken & Stöddokument immunterapi intranätet](#)
- [Kontaktuppgifter konsult](#)
- Vid infusionsreaktion som t.ex. feber, frossa eller värk bör Paracetamol 1000 mg och Desloratadin 5 mg ges. Detta kan också övervägas att ges som premedicinering inför behandlingar därefter.
- Dosreduceras ej. Avstå från behandlingstillfälle vid toxicitet.
- Patient med TB eller Hepatit-anamnes, kontakta infektion.
- [Provtagning immunoterapi singel](#)

### Biverkningar

Grad I	Symtomatisk behandling
Grad II	Uppehåll med behandling. Steroid behandling motsvarande Prednisolon 1-2 mg/kg per dag. Reduceras när biverkningar är grad I, minst 4 veckors steroidbehandling
Grad III- IV	Behandlingen utsättes permanent. Metylprednisolon i.v. 125 mg dag 1, därefter Prednisolon 1-2 mg/kg per dag p.o. Om ej svar på prednisolon ge Infiximab (Remicade) 5 mg/kg x 1

Biverkningar ska rapporteras som Events of Clinical Interest och SAE

### Patientinformation

### Körschema

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		-
2	Akutvagn tillgänglig		
3	Ge Pembrolizumab spädd i 100 Natriumklorid 9 mg/ml	30 minuter	Cytodose

### Anmärkningar

Telefonkontakt med patienten till sjuksköterska 1 vecka efter första behandlingen, därefter individuell bedömning. Kontroll av immunorelaterade biverkningar.